

чѣмъ въ психозахъ первичныхъ и эссенціальныхъ. При наличности же веселаго, довольнаго, счастливаго настроенія духа въ данномъ случаѣ испытуемый могъ казаться пьянымъ, даже ничего не пивши.

Въ заключеніи авторъ, отмѣча невѣрность того положенія, что часто, наблюдая у маніаковъ склонность къ злоупотребленію спиртными напитками, считаютъ причиной болѣзни—пьянство, полагаетъ, что въ этихъ случаяхъ пьянство является не причиной, а скорѣе симптомомъ болѣзни.

Г. Сороковиковъ.

## Нервныя болѣзни.

**Д-ръ С. Д. Янпольскій.** *Къ казуистикѣ раненій спинного мозга.* Вопросы нервно-психической медицины. Іюль-Сентябрь 1903 г.

Авторъ описываетъ 2 случая травматического поврежденія спинного мозга.

1., П. упалъ съ крыши на острие топора, перерубившее ему спинной хребетъ. Б-ной пересталъ владѣть ногами. Сознаніе ясное. Полное отсутствіе произвольныхъ движеній и чувствительности нижнихъ конечностей, отсутствіе мочеиспусканія и испражненій. Рана лигнейная, длиною 10—12 см., воронко-образно съуживаясь, проникаетъ на значительную глубину.

Спинной мозгъ вмѣстѣ съ оболочками перерѣзанъ, повидимому, во всю толщу. Сочится спинно-мозговая жидкость. Т° 40°, Р.—120. Далѣе образовались пролежни, быстро увеличивающіеся; б-ной чрезвычайно похудѣлъ. На 15-ый день смерть при явленіяхъ быстро нарастающаго восходящаго паралича.

2. Р., упавъ съ высоты, повредилъ себѣ голову и шею. Отмѣчается фибриллярное сокращеніе плечевыхъ мышцъ, особенно на правой руцѣ. Произвольные движения, во всемъ тѣлѣ отсутствуютъ, за исключеніемъ предплечій, которыхъ б-ной въ состояніи приподнять до прямого угла съ надплечьемъ. Голову слегка поворачиваетъ. Отправленія прямой кишкі и мочевого пузыря отсутствуютъ. Сознаніе ясное. Т° нормальная, пульсъ 72. Foetus ex ore. Дыханіе учашено, поверхностно. Зрачки расширены. Самочувствіе очень плохо, полный упадокъ силъ. Черезъ 2-ое сутокъ б-ной скончался.

Такимъ образомъ въ 1-мъ случаѣ отмѣчаются трофическія разстройства: исхуданіе, пролежни и проч.

Во 2-мъ совершенно изолированныя произвольные движения предплечій, обусловленныя очевидно чисто анатомическими особенностями мѣстонахожденія травмы.

A. Сколозубовъ.