

ХИРУРГІЯ.

Н. Тринклеръ. *Къ казуистикѣ мезентеріальныхъ опухолей.* Хирургія. Февраль, 1901 г.

Авторъ приводитъ исторію болѣзни случая злокачественной мезентеріальной опухоли, характеръ которой и ея топографическое положеніе были распознаны до операции. Удаленіе опухоли съ резекціей 65 с. кишекъ; была примѣнена пуговка Murphy. На 5 сутки, благодаря частичному омертвѣнію на мѣстѣ смыканія пуговки, резецировано еще 20 сант. кишки.

На основаніи своего случая авторъ совѣтуетъ при удаленіи мезентеріальныхъ опухолей, гдѣ резецируется большой секторъ брыжжейки и нѣсколько петель кишекъ, выводить это мѣсто наружу, какъ при гангренозныхъ грыжахъ, подводя подъ петлю, гдѣ пуговка, марлевый компрессъ и томпонирова брюшную полость съ боковъ по Mikulicz'у.

Казуистика мезентеріальныхъ опухолей, оперированныхъ съ резекціей кишекъ, не велика; случай автора 12-ый. Смертность достигаетъ 50%; причиной смерти считаютъ прободной перитонитъ, а также шокъ послѣ продолжительныхъ манипуляцій на кишечникѣ. Въ случаяхъ, гдѣ величина опухоли дѣлаетъ удаленіе невозможнымъ, авторъ, на основаніи своего одного наблюденія, рекомендуетъ для уменьшенія опухоли прошиваніе сосудовъ брыжжейки. Дать точныхъ диагностическихъ признаковъ для всѣхъ случаевъ опухолей брыжжейки, по мнѣнію автора, невозможно.

И. Левинъ.

Проф. В. И. Разумовскій. *Къ вопросу о предсказаніи при опухоляхъ брыжжейки.* Лѣтопись русской хирургіи. 1901 г. Книга 2-ая.

Указавъ на новизну и малую разработанность отдѣла хирургіи о плотныхъ опухоляхъ брыжжейки, авторъ считаетъ важнымъ выясненіе (возможное путемъ клиническаго опыта) вопроса о предсказаніи при