

раціи гастростоміи, числомъ 5. Показаніемъ къ операціи было: ожогъ пищевода сѣрной кислотой—1 сл., флегмона пищевода со вскрытіемъ нарыва въ трахею—1 сл., ракъ пищевода—3 сл. Операція произведена по Hacker—Frank—Witzel'ю. Результатъ операціи на первый взглядъ далеко не блестящій: трое изъ оперированныхъ умерли очень скоро послѣ операціи до истечения 3 сутокъ, четвертый жилъ 32 и пятый—109 дней. Но слѣдуетъ принять во вниманіе, что въ трехъ случаяхъ операція была предпринята in extremis, а въ остальныхъ случаяхъ положеніе больныхъ передъ операціей было очень тяжелое. Авторъ при этомъ подчеркиваетъ, во первыхъ, неудобство способа Franc'a, а, во вторыхъ, пригодность мѣстной анестезіи, напр., по Schleich'у. Вторую группу составляютъ случаи гастроэнтеростоміи—6 сл. Показаніемъ къ операціи во всѣхъ случаяхъ былъ ракъ привратника. Способъ операціи—Kosher'a. Исходъ операціи: смерть на 3-й день (отъ сепсиса)—1 сл., на 11-й день (отъ нефрита)—1 сл., остальные больные жили послѣ операціи отъ 50 дней до 2 лѣтъ, т. е. средняя продолжительность жизни для этихъ 4 случаевъ равняется  $8\frac{1}{2}$  мѣс. Третью группу составляютъ случаи изсѣченія привратника—4. Показаніемъ во всѣхъ случаяхъ былъ ракъ pylori. Операція производилась по способу Kosher'a. Исходъ операціи—смерть въ 1 сл. и выздоровленіе въ остальныхъ трехъ. Причина смерти въ указанномъ случаѣ былъ септический перитонитъ, развившійся вслѣдствіе прорѣзанія швовъ на задней поверхности duodeni. Этотъ случай представлялъ большія техническія трудности во время операціи, такъ какъ пришлось удалить почти всю малую кривизну желудка. Наибольшій срокъ выздоровленія въ трехъ случаяхъ, кончившихся счастливо, былъ 21 мѣс., и въ одномъ изъ этихъ случаевъ черезъ 33 дня послѣ операціи, тому же больному было произведено двустороннее грыжесѣченіе по Bassini.

Пл. Тиховъ.

## КОЖНЫЯ И ВЕНЕРИЧЕСКІЯ БОЛѢЗНИ.

Проф. О. В. Петерсенъ. *Сборникъ работъ по кожнымъ болѣзнямъ, сифилису, венерическимъ и другимъ болѣзнямъ за 1874—1899 г.*

Книга представляетъ собою собраніе работъ, напечатанныхъ проф. Петерсеномъ за періодъ времени 1874—1899 гг.

Статья 1-я: «Экспериментальныя изслѣдованія патогенеза и терапіи цистита» (Дисс., напечатанная на нѣмецк. языкѣ въ 1874 году). Въ этой работѣ авторъ на основаніи опытовъ надъ собаками приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ: а) вслѣдствіе инъекцій жидкостей, содержащихъ коккобактеріи, въ мочевомъ пузырьѣ собакъ развивается циститъ; б) при инъекціяхъ жидкости, содержащихъ коккобактеріи, дѣйствуютъ на мочевой пузырь интенсивнѣе, нежели жидкости, не содержащие коккобактерій; в) посредствомъ инъекцій салициловой кислоты можно уменьшить циститъ.

Статья 2-я: «Рѣдкія осложненія уретрита» (напеч. въ St. Petersburg. Med. Wochenschr. 1883). Авторъ описываетъ здѣсь 2 случая гнойнаго періуретрита, осложненнаго мочевыми затеками (одинъ) и піеміей (другой) и 1 случай нагноенія сѣмянныхъ пузырьковъ.

Статья 3: «О гонококкахъ и леченіи перелоя» («Врачъ» 1886): при леченіи перелоя нужно преслѣдовать двѣ цѣли; во первыхъ, устранить возбудителей болѣзни, т. е. гонококковъ, во вторыхъ, устранить вызванныя ими измѣненія. Первая цѣль, по мнѣнію проф. Петерсена, лучше всего достигается впрыскиваніями въ уретру раствора сулемы (1:5000) и внутреннимъ употребленіемъ *patri salicyli*; для устраненія же измѣненій, вызванныхъ гонококками, хорошо пользоваться растворами квасцовъ или уксусно-кислаго свинца, а также мѣстными прижиганіями растворомъ ляписа при помощи уретроскопа.

Статья 4-я: «Уретральный ирригаторъ» (*Monatshefte f. Derm.* 1887): описаніе уретрального шприца собственного образца.

Статья 5-я: О леченіи *urethritis infectiosa*. (Докладъ, читанный въ общ. Спб. врачей. St. Petersburg. Med. Wochenschr. 1887). Авторъ рекомендуетъ слѣдующій способъ леченія уретрита: въ началѣ для обеззараживанія уретры—впрыскиванія въ уретру съ помощью шприца—ирригатора раствора сулемы (1:10—20000) до тѣхъ поръ, пока отдѣленіе не потеряетъ гнойнаго характера, а затѣмъ для устраненія катарральнаго состоянія слизистой оболочки канала—впрыскиванія *plumb. acetic.* (1/0) или *alumin. pulv.* (2/0).

Статья 6-я: «Воспаленіе сѣмянныхъ пузырьковъ, какъ осложненіе перелоя» («Врачъ» 1892). Описывается случай сперматоцистита.

Статья 7-я: «Воспаленіе сѣмянныхъ пузырьковъ, какъ осложненіе перелоя» (Труды V съѣзда общ. русс. вр. въ память Пирогова). Наблюденія проф. Петерсена показываютъ, что сперматоциститъ, какъ осложненіе перелоя встрѣчается нерѣдко.

Статья 8-я: «О леченіи сифилиса подкожными впрыскиваніями пепсино-сулемовымъ растворомъ» (St. Petersburg. Med. Wochenschr. 1879).

Статья 9-я: «Частичный недостатокъ луча у сифилитика» (St. Petersburg. Med. Wochenschr. 1880).

Статья 10-я: «Положеніе венерическихъ мужскихъ больныхъ въ больницахъ Петербурга» («Врачъ» 1882). Цифровыми данными доказывается необходимость мѣръ для улучшенія положенія больныхъ—венериковъ въ Петербургѣ.

Статья 11-я: «Давящая повязка при леченіи бубоновъ» («Врачъ» 1883). Давящая повязка при гноящихся бубонахъ значительно ускоряетъ заживленіе послѣднихъ.

Статья 12-я: «Основная азотно-кислая окись висмута, въ качествѣ наружнаго средства, при венерическихъ и кожныхъ болѣзняхъ» («Врачъ» 1884).

Статья 13-я: «Антисептика въ области венерич. болѣзней» (Deutsche Medicinal. Leitung 1885).

Статья 14-я: «О распространѣніи венерич. болѣзней среди мужскаго населенія С-Петербурга». Докл., читанный на 1-мъ съѣздѣ русскихъ врачей.

Статья 15-я: «Къ вопросу о вѣполовомъ зараженіи сифилисомъ. Случай твердаго шанкра миндалевидной железы». («Врачъ» 1886).

Статья 16-я: «Опытъ патолого-анатомической статистики сифилиса внутреннихъ органовъ». («Врачъ» 1887). Авторъ на основаніи данныхъ Александровской больницы приходитъ къ выводу, что сифилисъ внутреннихъ органовъ встрѣчается въ 2,3% всего числа вскрытій; чаще всего пораженной оказывалась печень, затѣмъ—почки и селезенка.

Статья 17-я: «О глубокихъ впрыскиваніяхъ каломеля для леченія сифилиса» (Труды 2-го съѣзда русс. врачей. Т. II).

Статья 18-я: «Отчетъ по венерическимъ отдѣленіямъ Александровской, въ память 19-го февраля 1861 г., больницы за 1887 годъ».

Статья 19-я: «Выскабливаніе мягкаго шанкра» («Врачъ» 1889). Выскабливаніе (острой ложечкой) язвъ даетъ хорошіе результаты: язвы зарубцовывались въ среднемъ черезъ 9,9 дня.

Статья 20-я: «Альбуминурія при сифилисѣ». («Врачъ» 1891).

Статья 21-я: «О повышеніяхъ температуры послѣ впрыскиваній салицилово-кислой ртути при сифилисѣ» (Больничная газета Боткина 1891). При свѣжемъ сифилисѣ температурныя повышенія послѣ впрыскиваній встрѣчаются чаще, чѣмъ при возвратахъ сифилиса.

Статья 22-я: «Матеріалы къ вопросу о врачебной тайнѣ по отношенію къ сифилису и венерическимъ болѣзнямъ». Докл., читанный въ Русск. Сифилид. и Дерм. общ. 1892).

Статья 23-я: «О микробахъ мягкаго шанкра» («Врачъ» 1893).

Статья 24-я: «Современное состояніе вопроса о леченіи сифилиса» (St. Pet. Wochensehr. 1895).

Статья 25-я: «О мѣрахъ борьбы съ сифилисомъ въ Россіи» («Врачъ» 1895).

Статья 26-я: «Лекціи о мягкомъ шанкрѣ». Подробное изложеніе ученія о мягкомъ шанкрѣ.

Статья 27-я: «О пораженіяхъ гортани при сифилисѣ» (Дневникъ VI съѣзда общ. русс. врач.).

Статья 28-я: «О сифилисѣ и венерич. болѣзняхъ въ городахъ Россіи» (Докладъ, читанный на Высочайше разрѣш. съѣздѣ по обсужденію мѣръ противъ сифилиса въ Россіи).

Статья 29-я: «Подготовка медицин. персонала для борьбы съ сифилисомъ» (Труды Высочайше разрѣш. съѣзда по обсужд. мѣръ противъ сифилиса въ Россіи).

Статья 30-я: «Объ измѣненіи зубовъ у сифилитиковъ» («Врачъ» 1899). Hutchinson'овскіе зубы бываютъ и у людей, неимѣвшихъ сифилиса.

Статья 31-я: «О номенклатурѣ сифилиса съ точки зрѣнія статистики» (Conference internat. pour la prophylaxie de la syphilis. Bruxelles. 1899).

Статья 32-я: «4 случая purpura simplex» (St. Pet. med. Wochenschr. 1878).

Статья 33-я: «43 случая проказы въ Петербургѣ» (Врачъ 1888).

Статья 34-я: «О распространѣніи проказы въ Россіи» («Еженедѣльная клинич. газета». 1889). Авторъ собралъ 817 случаевъ; главныя гнѣзда проказы находятся въ Прибалтійскомъ краѣ, сѣверной части Кавказа и въ Средне-азиатскихъ владѣніяхъ.

Статья 35-я: «О леченіи проказы салициловымъ натріемъ» (Докладъ, читанный въ Прагѣ 1889 г.).

Статья 36-я: «О лепрозоріяхъ въ Норвегіи» (St. Petersb. med. Wochenschr. 1891).

Статья 37-я: «О прирѣзѣнн прокаженныхъ» (Труды 4 съѣзда Русск. Врачей).

Статья 38-я: «О распространѣніи проказы въ Россіи» (Вѣстникъ общ. гигиѣны 1893). Данныя отчетовъ Медицинскаго Департамента за 1888—1890 г. говорятъ, что въ Россіи имѣются прокаженные въ 59 губерніяхъ, представляющихъ значительныя разницы по отношенію климатическихъ и почвенныхъ условій.

Статья 39-я: «О больничномъ леченіи кожныхъ больныхъ въ Петербургѣ» («Врачъ» 1895).

Статья 40-я: «Объ угловатой ломкости волосъ (trichorrhexis nodosa)» («Врачъ» 1896) Trichorrhexis nodosa—довольно часто встрѣчающееся заболѣваніе, обусловливаемое недостаточнымъ питаніемъ, иногда же чужеродными.

Статья 41-я: «Основы леченія экземы» (St. Petersb. Wochenschr. 1896).

Статья 42-я: «О первыхъ проявленіяхъ проказы» («Врачъ» 1897). Въ большинствѣ случаевъ первыми наружными явленіями бывають красныя пятна (erythema leprosum),—при узловатой формѣ преимущественно на лицѣ, а при пятнистой—на конечностяхъ; мѣстомъ первыхъ явленій могутъ быть и слизистыя оболочки.

Статья 43-я: «О распространѣніи кожныхъ болѣзней въ Россіи» (Труды VII съѣзда общества Русскихъ врачей).

Ст. 43-я: «Случай гнойнаго воспаленія желудка»; ст. 45-я: «Одинъ случай разрыва червеобразн. отростка вслѣдствіе закупорки кишечнымъ камнемъ»; ст. 46-я: «Къ вопросу о дезинфекціи въ больницахъ»; ст. 47-я: «Способъ уничтоженія запаха іодоформа»; ст. 48-я: «О больницы прислугѣ»; ст. 49-я: «Операционная кровать для венерическихъ больныхъ»; ст. 50-я: «О разрывѣ селезенки при возвратной горячкѣ»; ст. 51-я: «Одинъ случай отравленія ягодами тутоваго дерева»; ст. 52-я: «Три случая разрыва печени»; ст. 53-я: «О пересадкѣ кожи лягушки на гранулирующія раны человѣка»; ст. 54-я: «Іодоформный карандашъ»; ст. 55-я: «Объ ампутаціи мужского члена»; ст. 56-я: «Нѣсколько словъ о такъ наз. канадолѣ»; ст. 57-я: «Обеззараживающее дѣйствіе анилиновыхъ красокъ Мерска»; ст. 58-я: «Эйрофенъ».

какъ перевязочное средство»; ст. 59-я: «Леченіе волчанки по способу проф. Finsen'a; и 60-я: «О леченіи парши волосистой части головной кожи».

А. Хитрово.

## Психіатрія.

(Подъ редакціей В. И. Левчаткина).

**Д-ръ І. В. Аптекманъ:** *Къ статистикѣ и этиологіи общаго прогрессивнаго паралича помѣшанныхъ въ Смоленской губерніи. Обзорѣніе психіатріи, неврол. и эксп. псих., №№ 9. 10. 11. 12. 1900 г.*

Авторъ въ своей обстоятельной статьѣ приводитъ наблюденія, обнимающія собою періодъ времени въ 11 лѣтъ съ 1888 по 1898 г. включительно надъ 233 паралитиками—182 муж. и 51 жен., пользовавшимся въ Смоленской психіатрической больницѣ. По его наблюденіямъ, на каждыя 100 поступленій приходилось 9,84 случаевъ нарастающаго паралича у мужчинъ и 4,92—у женщинъ. При этомъ, на каждыхъ 100 поступившихъ паралитиковъ муж., абсолютно—27, 97 женщ.; относительное же число, на каждыхъ 100 муж.—50 женщ. Авторъ находитъ, что его данныя занимаютъ какъ бы среднее мѣсто между таковыми же изысканіями другихъ наблюдателей. Поступленія паралитиковъ съ каждымъ годомъ все увеличиваются, въ особенности это замѣтно, если разсматривать поступленія больныхъ по пятилѣтіямъ, въ связи съ движеніемъ душевно больныхъ вообще. Количество заболѣваній прогрессивнымъ параличемъ у женщинъ тоже съ каждымъ годомъ увеличивается, что подтверждается также и многими другими авторами. Прогрессивнымъ параличемъ поражаются по преимуществу въ самый зрѣлый въ тѣлесномъ и душевномъ отношеніяхъ возрастъ, и оба пола въ этомъ отношеніи не представляютъ никакихъ отличій, и что это явленіе слѣдуетъ разсматривать, какъ постоянное и всеобщее во всѣхъ случаяхъ паралича. По семейному положенію у автора наибольшій % паралитиковъ падаетъ на женатыхъ и вдовыхъ. Разсматривая таблицы, въ которыхъ больные распределены по званію и занятіямъ, авторъ находитъ слѣдующее: 1) первенствующее мѣсто при-