

ныхъ животныхъ попадаютъ фолликулы со сморщенной и утолщенной *Zona pellucida*. 6) Яйцевая клѣтка часто гиалиново перерождается и уменьшается въ объемѣ: сначала углощается *Zona pellucida*, граница между нею и тѣломъ клѣтки становится менѣе ясна, ядро еще видно, но потомъ и оно подвергается перерожденію, и остатокъ яйцевой клѣтки представляется сморщеннымъ небольшимъ гомогеннымъ комкомъ. 7) Измѣненія въ желудкѣ при введеніи 20<sup>0</sup> алкоголя у кроликовъ и гусей слабо выражены. 8) Періодъ возбужденія при дозахъ 3—4 грам. на 1 килограм. вѣса животнаго авторомъ не наблюдался ни у кроликовъ, ни у гусей. 9) При хорошемъ уходѣ и питаніи доза алкоголя 3—4 грам. на 1 килограм. вѣса при ежедневной дачѣ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ (до 6) вызываетъ у кроликовъ паденіе вѣса тѣла только въ первые 30—40 дней, а потомъ не только пополняется эта убыль, на вѣсъ тѣла даже прибавляется. 10) Отравленіе самокъ кроликовъ алкоголемъ сильно вліяетъ на ихъ потомство, такъ какъ часто бываютъ выкидыши, много дѣтенышей родится мертвыхъ и изъ родившихся живыхъ многіе погибаютъ въ первые дни жизни.

Б. Алаѣоновъ.

---

## Психіатрія.

(Подъ редакціей В. И. Левчатнина).

**М. М. Маевскій.** *Діонинъ при маниакальномъ и половомъ возбужденіи.* Неврологическій Вѣстникъ, Т. X, Вып. I.

Діонинъ многократно примѣнялся авторомъ въ Казанской Округной Лечебницѣ у маниакальныхъ больныхъ и больныхъ страдавшихъ острою спутанностью, причемъ оказалось, что онъ явно благотворно дѣйствуетъ при половомъ возбужденіи. Авторъ приводитъ 19 исторій болѣзней лицъ, получавшихъ діонинъ подкожно и внутрь въ рядѣ случаевъ душевнаго возбужденія, со спутанностью сознанія, сопровождающихся гипереміей головного мозга и въ рядѣ случаевъ повышенныхъ половыхъ стремленій. И приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

Въ первомъ рядѣ случаевъ—діонинъ постепенно уничтожилъ гиперемію, двигательное безпокойство, крайняя раздражительность, спутанность сознанія,—все это дѣлалось мало по малу менѣе выра-

женнымъ и душевное состояніе настолько выровнялось, что авторъ находитъ возможнымъ говорить въ данныхъ случаяхъ объ улучшеніи въ душевномъ здоров'ѣ больныхъ, достигнутомъ при помощи діонина.

Во второмъ рядѣ случаевъ діонинъ замѣтно понижаеъ половую дѣятельность. При привычномъ и длительномъ рукоблудіи онъ дѣйствуетъ временно и скоропреходяще; при рукоблудіи остромъ, являющемся какъ симптомъ остропротекающихъ психозовъ, діонинъ можетъ явиться цѣннымъ средствомъ, могущимъ прекратить рукоблудіе.

Внутренніе приемы діонина въ тѣхъ же дозахъ или даже нѣсколько большихъ, не оказываютъ того же дѣйствія, какъ подкожные.

*А. Сколозубовъ.*

**Д-ръ Л. О. Бобровскій-Королько.** *Случай своеобразнаго истерическаго сумеречнаго состоянія.* Неврологическій Вѣстникъ. Т. X, вып. I. 1902 г.

Подобно описаннымъ Д-ромъ Ganser'омъ случаямъ своеобразнаго сумеречнаго состоянія у истериковъ, авторъ въ своей статьѣ представляетъ случай такого-же состоянія, наблюдаемаго имъ у испытуемаго въ психиатрическомъ отдѣленіи Одесской Городской Больницы. Этотъ испытуемый передъ заболѣваніемъ провелъ нѣсколько мѣсяцевъ въ тюрьмѣ, имѣлъ несомнѣнные признаки истерическаго свойства и проявлялъ спутанность сознанія своеобразнаго характера.

Въ заключеніи авторъ вполне присоединяется къ мнѣнію того-же Ganser'a, который говоритъ, что «многіе такъ называемые тюремные психозы сопровождаются истерическими явленіями».

*Г. В. Сороковиковъ.*

**В. С. Яковенко.** *Острый галлюцинаторный психозъ на почвѣ отравленія атропиномъ.* Обзорніе психіатріи, неврологіи и эксперимент. психологіи 1902 г. № 2.

Авторъ сообщаетъ о случаѣ отравленія атропиномъ, выразившемся въ припадкахъ остраго галлюцинаторнаго помѣшательства. Вслѣдствіе того, что полный анамнезъ возможно было собрать только послѣ выздоровленія больной, этотъ случай отравленія протекалъ безъ фармацевтическаго вмѣшательства и потому былъ доступенъ наблюденію во всей своей чистотѣ и полнотѣ.