

РЕФЕРАТЫ.

Внутреннія болѣзни.

Д-ръ К. Eckert. *О леченіи легочной чахотки стираколомъ.*
(Munch. med. Wochensch. № 41—1905 г.)

Для леченія своихъ больныхъ авторъ воспользовался препаратомъ стираколомъ, представляющимъ изъ себя соединеніе гваяколя съ коричной кислотой и предложеннымъ еще въ 1891 году.

Стираколь есть не растворимый въ водѣ и слабыхъ кислотахъ порошокъ, безъ всякаго запаха и вкуса. Въ желудкѣ онъ не расщепляется на свои составныя части и не раздражаетъ подобно многимъ другимъ средствамъ слизистой оболочки. Только въ тонкихъ кишкахъ онъ распадается на гваяколь и коричную кислоту и въ теченіи 24 часовъ почти полностью усваивается. Сравнивая усвоеніе стиракола съ другими препаратами Дуоталемъ и тіоколемъ по большому или меньшему выдѣленію эфиромъ-сѣрной кислоты, авторъ нашелъ, что дуоталь усваивается въ количествѣ 50%, тіоколь 0, орезоль (gajaocol glycerin-aethaer) очень немного, стираколь же 85, 94%. Взявъ во вниманіе лучшую усвояемость стиракола, авторъ примѣнялъ его по преимуществу въ начальныхъ стадіяхъ туберкулеза легкихъ, 7 случаевъ, и въ 3-хъ съ значительными измѣненіями въ легкихъ гдѣ имѣлось еще пораженіе кишечника. Во всѣхъ случаяхъ замѣчалось улучшеніе аппетита, прибавка въ вѣсѣ больныхъ, напр. въ случаѣ 8 за недѣлю на 5 фунтовъ а при дальнѣйшемъ леченіи на 13 ф.; замѣчалось также улучшеніе и со стороны отдѣленія мокроты и ночныхъ потовъ; кашель становился меньше, отдѣленіе мокроты также уменьшалось а равно и ночные поты и др. признаки. Для взрослыхъ авторъ назначалъ стираколь по 1,0, 2—3 раза въ день и при долгомъ употребленіи не замѣчалъ никакихъ побочных дѣйствій.
