

крѣпкія шипшы, и между шипшами и лигатурой слизистая разсѣкается ножомъ или еще лучше пакеленомъ. Эта лигатура служитъ какъ бы первымъ рядомъ швовъ, да кромѣ того сю останавливается кровото-
ченіе; наложеніемъ серозномышечныхъ швовъ поканчиваютъ съ желуд-
комъ; подобный же приѣмъ примѣненъ и на 12-перстной кишкѣ, при-
чемъ вмѣсто Lembert'овскаго шва авторъ считаетъ достаточнымъ 2-3
этажа кисетнаго шва; затѣмъ отыскиваютъ и удаляютъ метастазы, ру-
ководствуясь указаніями Miculiz'a; операція заканчивается производст-
вомъ задней гастроентеростоміи. Свою статью авторъ заканчиваетъ
слѣдующими словами: Вотъ путь, иля которымъ, мы можемъ значи-
тельно продлить время жизни заболѣвшихъ ракомъ привратника. По-
ка-же что, тѣмъ больнымъ съ ракомъ привратника, которыхъ представ-
ляютъ намъ за недѣлю до смерти, мы должны производить gastroen-
terostomiю, чтобы избавить ихъ отъ голодной смерти и продлить
жизнь хоть на нѣсколько мѣсяцевъ.

И. Левинъ.

Пр.-доц. Вреденъ. *О мѣстной анестезіи въ брюшной хирургіи.*
Лѣт. Рус. Хир. 1901 г., кн. 1.

Мѣстная анестезія имѣетъ большія преимущества передъ общимъ наркозомъ у крайне истощенныхъ и слабыхъ субъектовъ, одержимыхъ
разнаго рода легочными и сердечными страданіями. Лучшимъ спосо-
бомъ такой анестезіи по автору—способъ Reclus (1⁰/₁₀₀ кокаинъ), но
для полнаго успѣха нужно еще устранить отраженныя явленія раздра-
женія брюшины, что достигается впрыскиваніемъ больному хорошей
дозы морфія (0,01 грм.). Такая комбинація кокаина съ морфіемъ,
удовлетворяющая всѣмъ требованіямъ, какія брюшная хирургія предъ-
являетъ къ мѣстной анестезіи, была примѣнена въ клиникѣ Ратимова
въ 15 случаяхъ, исторіи болѣзни которыхъ приведены авторомъ; ко-
личество примѣненнаго кокаина не превышало 10—12 ширицевъ 1⁰/₁₀₀
раствора.

Такая мѣстная анестезія не примѣнима у дѣтей, у истеричныхъ,
а также въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ планъ операціи почему-либо не мо-
жетъ быть заранѣе выработанъ, при типичныхъ же операціяхъ нужно
отдать предпочтеніе какаину предъ общимъ наркозомъ.

И. Левинъ.