

иодистое лѣченіе и мѣстно на железъ мазь: jodi puri 0,5, kalii jodat. 2,0, lanolin—vaselin. aa 15,0. Болѣзнь прошла чрезъ 5 дней, железы сильно уменьшились, а послѣ 30 впрыскиваний исчезли всѣ явленія сифилиса. Болѣзнь и увеличеніе локтевыхъ и паховыхъ железъ были настолько значительны, что совершенно препятствовали движенію.—Настоящій случай въ практикѣ автора далеко не первый.

C. Порфириевъ.

Проф. И. Зеленевъ. *Largin.*—Русскій журналъ кожныхъ и венерическихъ болѣзней. 1901 г. № 1.

Largin—буроватый порошокъ—представляетъ собою соединеніе бѣлка съ серебромъ (11,1% послѣдняго), растворимъ въ холодной и горячей водѣ до 10,5%, въ концентраціи 1:4000 убивалъ гонококковъ въ теченіе 10 минутъ (Pezzoli).

Авторъ на основаніи «очень большого матеріала» признаетъ *largin* весьма действительнымъ средствомъ при леченіи какъ переднаго, такъ и заднаго перелоя и въ острой, и хронической формахъ, а также и при пораженіяхъ пузыря.

Главное преимущество *largin*'а авторъ видитъ въ сильно-дезинфицирующихъ свойствахъ послѣдняго: «ни отъ одного средства, пишетъ онъ, я не получалъ такой полной дезинфекціи, какъ отъ *largin*». Послѣ примѣненія его въ центрофугованной мочѣ микроскопически не удавалось открыть ни одной бактериальной формы, тогда какъ до лечения каналъ изобиловалъ микроорганизмами. Наблюдавшееся при *largin*'ѣ, въ первый годъ его примѣненія, сильное раздраженіе—учащенійный позывъ на мочеиспусканіе—теперь, благодаря лучшей выработкѣ препарата, устранило совсѣмъ.

Не признавая цѣлесообразнымъ рекомендуемый многими авторами пріемъ задерживанія лекарства въ каналѣ на 25—30 минутъ, авторъ въ случаяхъ острого триппера примѣняетъ лишь обильное орошеніе канала нѣсколько разъ къ ряду. Концентрація раствора при остромъ трипперѣ колебалась отъ $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{2}\%$. Характеръ выдѣленія рѣзко мѣнялся чрезъ 3—4 дня, самое большое, чрезъ недѣлю, а все лечение занимало отъ 2 до 3 недѣль. При хроническомъ уретритѣ (задѣтъ былъ и мочевой пузырь) авторъ вводилъ въ пузырь или по Janet'у, или чрезъ тонкій (Forges № 13) тщательно обеззараженный катетеръ водный растворъ *largin*'а въ количествѣ 500 гр. Больной выводилъ потомъ растворъ самопроизвольно. Начальная концентрація съ $\frac{1}{5}\%$, въ теченіе 3 недѣль, постепенно повышалась до 1—