

**Проф. Анфимовъ.** *O dementia praecox.* Журналъ Невропат. и психіатр. имени С. С. Корсакова. 1902, кн. 1 и 2.

Dementia praecox Kräpelin'a, по крайней мѣрѣ та разновидность ея, когда слабоуміе наступаетъ незамѣтно и постепенно безъ предвѣстниковъ, первично, есть imbecillitas progressiva или dementia primaria incurabilis progressiva. Остальная же формы dementiae praecox, какъ ихъ рассматриваетъ Kräpelin, не представляютъ чего либо новаго, чего бы не было сказано въ описаний гебефреній.

Dementia же paranoides можетъ подлежать совсѣмъ иному tolkovанию.

Встрѣчаются случаи, когда, въ молодомъ возрастѣ, 16—18—20 лѣтъ, наступаетъ слабоуміе, но еще вопросъ, дѣйствительно ли переходъ къ слабоумію совершился «незамѣтными шагами, путемъ постепенной умственной убыли», или этому состоянію слабоумія предшествовалъ рядъ болѣе или менѣе замѣтныхъ психопатическихъ состояній, которыхъ уносили «часть умственныхъ силъ» и мало по малу приводили къ слабоумію.

Въ настоящее время еще нельзя утверждать, что существуютъ случаи незамѣтного или первичного развитія слабоумія.

Можно допустить, что болѣе или менѣе замѣтные психические пертурбации, ведущія къ слабоумію, обыкновенно просматриваются врачами.

Съ другой стороны Dementia praecox Kräpelin'a можетъ быть слѣдствиемъ цѣлаго ряда инфекцій: тифа, острыхъ сыпей и особенно инфлюензы, которая для юныхъ больныхъ, особенно дегенерантовъ, нерѣдко имѣютъ роковое значеніе; нельзя говорить о первично наростающемъ слабоуміи въ тѣхъ случаяхъ, где его развитію предшествуетъ то или другое острое психическое или физическое заболеваніе. Dementia praecox Kräpelin'a не есть ли поэтому просто dementia secundaria?

B. Колотинскій.

**П. Б. Ганнушкинъ и приватъ-доцентъ С. А. Сухановъ.** *Къ ученію о меланхолії.* (Изъ Московской Психіатрической Клиники). Журналъ Невропатологіи и психіатрії имени С. С. Корсакова 1902, кн. 6.

Изслѣдованія авторовъ опираются на 278 случаевъ меланхолії; въ это число вошли, какъ стационарные (меныш. часть), такъ и амбулаторные больные. Авторы устанавливаютъ, что женщины болѣе предрасположены къ заболеванію меланхоліей, чѣмъ мужчины; и что среди душевно-больныхъ женщинъ не менѣе одной десятой части приходится на долю страдающихъ меланхоліей. Наслѣдственность отмѣ-