

Д-ръ Н. Топорковъ. *Истерическій мутизмъ, аграфія и клептоманія.* Обзорніе Психіатріи, Неврологіи и экспериментальной психологіи № 7.—1902 г.

Приведа довольно подробно литературу вопроса, авторъ описываетъ больную, поступившую въ Казанскую Окружную Лечебницу съ явленіями мутизма, развившагося у нея внезапно, въ дорогѣ. На другой день поступленія больной былъ предложенъ авторомъ гипнозъ, послѣ котораго она заговорила совершенно свободно. Больная представляеть яркій примѣръ истерическаго характера; страдаетъ клептоманіей.

Типическій симптомокомплексъ истерическаго мутизма съ аграфіей развился у больной уже за время пребыванія въ Лечебницѣ на ряду съ состояніемъ крайняго возбужденія. Исчезъ онъ подъ вліяніемъ внушенія въ бодрственномъ состояніи.

По вопросу о патогенезѣ страданія авторъ считаетъ наиболѣе вѣроятной гипотезу Шарко, который видитъ причину истерической нѣмоты въ психическомъ параличѣ рѣчевого центра. Такой же психическій параличъ лежитъ по этой гипотезѣ въ основѣ истерической аграфіи.

А. Сколзубовъ.

Н. Н. Топорковъ. *Психозъ послѣ ожога.* Медицин. Обзр. 1903 г., кн. 1.

Душевное разстройство послѣ ожога наблюдается крайне рѣдко. Авторъ нашелъ въ литературѣ только единственное описаніе случая проф. Regis, да ссылку на случай Fowille'я у Эммингауза.

Въ случаѣ автора психозъ развился у 25-ти лѣтней крестьянки, получившей обширный ожогъ третьей степени спины, части грудной железы, плеча и предплечія на одной сторонѣ. Черезъ 15 дней послѣ ожога у больной появился бредъ и обильные обманы органовъ зрѣнія и слуха. Кромѣ того отмѣчалась подавленность настроенія, безсвязность рѣчи и проч. Въ общей сложности душевное разстройство продолжалось около мѣсяца. Авторъ останавливается на діагнозѣ: *Amentia hallucinatoria acuta*. Предрасполагающими моментами въ данномъ случаѣ онъ считаетъ предшествовавшіе (за 7 мѣсяцевъ до ожога) роды и кормленіе грудью, производящимъ же моментомъ является, по его мнѣнію, несомнѣнно ожогъ. Переходя къ вопросу о патогенетической связи между психозомъ и ожогомъ, авторъ склоненъ сводить сущность дѣйствія послѣдняго въ описываемомъ имъ случаѣ къ самоотравленію бактерійными токсинами, развившимися на обожженной поверхности кожи. Что именно этотъ моментъ игралъ главную роль, а не другіе, это вытекаетъ изъ того, что въ первые пять

дней при асептическомъ леченіи ожога признаковъ душевнаго разстойства не наблюдалось, и только послѣ того, какъ домашнимъ леченіемъ загрязнили рану и увеличили воспалительныя явленія, развился психозъ

В. Колотинскій.

Патологическая анатомія, общая патология и бактеріологія.

Г. Д. Бѣлоновскій. *О вліяніи впрыскиваній разныхъ дозъ гемолитической сыворотки на числовой составъ элементовъ крови.* Спб. 1902 г. Диссертация.

Мечниковъ первый высказалъ мысль о примѣненіи цитотоксиновъ въ практической медицинѣ, ему же (совмѣстно съ Безрѣдкой) принадлежитъ и честь перваго изслѣдованія въ этомъ направленіи.

Работа автора касается этого же интереснаго вопроса. Содержаніе ея слѣдующее: 1. Литературный очеркъ. 2. Изслѣдованіе условій, наиболѣе выгодныхъ для полученія гемолизиновъ наибольшей силы. 3. О дѣйствиіи впрыскиваній различныхъ дозъ гемолитической сыворотки на морфологическій составъ крови. 4. О впрыскиваніи гемолитической сыворотки анемичнымъ больнымъ съ лѣчебною цѣлью. Для опредѣленія силы гемолитической сыворотки авторъ пользовался способомъ, впервые предложеннымъ Kossel'емъ, получившимъ право гражданства послѣ работъ Эрлиха и Моргенрота и нѣсколько видоизмѣненнымъ имъ самимъ. Онъ беретъ рядъ цилиндриковъ; въ каждомъ изъ нихъ въ 1 кб. ст. 0,85% раствора Na Cl помѣщаются 3,2, 1 капля или какая-либо часть капли дефибринированной крови кролика (авторъ работалъ надъ кроликами и м. свинками); въ каждый цилиндрикъ капалось по 1-й каплѣ гемолитической сыворотки, полученной отъ м. свинки. Далѣе, всѣ цилиндрики ставились на 12 час. въ термостатъ и гемолитическая сила сыворотки опредѣлялась тѣмъ разведеніемъ, при которомъ происходило полное раствореніе крови. Если, напримѣръ, полное раствореніе отъ 1 капли гемолитической сыворотки наступало въ цилиндрикѣ, въ которомъ было $\frac{1}{4}$ капли крови, гемолитическая сила (V. h.) = $\frac{1}{4} : 1 = 1 : 4$. Путемъ нѣсколькихъ опытовъ авторъ приходитъ къ заключенію, что для полученія гемолитической сыворотки лучше всего иммунизировать свинокъ внутрибрюшными впрыскиваніями дефибринированной крови (кролика), а самой благоприятной для этого дозой оказались 5 кб. ст., при чемъ при каж-