

димымъ въ дѣйствіе педалью), позволяющій дезинфицировать разомъ нѣсколько шетокъ (12), держать ихъ въ безопасности отъ загрязненія и получать вещь, не прикасаясь къ остальнымъ.

П. Овчинниковъ.

Б. Бауэръ. *Рѣдкій по локализациіи случай сибирской язвы.* „Хирургія“. т. XII. № 72.

Авторъ описываетъ случай локализациіи заболѣванія на половомъ членѣ внизу за preputium, ближе къ корню члена. Заболѣваніе кончилось омертвѣніемъ кожного покрова члена и мошонки. Послѣдующая трансплантація по Thiersch'у дала неожиданный успѣхъ.

П. Овчинниковъ.

Прив.-доц. Д. Е. Гороховъ. *Леченіе автопластикой щечного сведенія челюстей.* „Хирургія“. т. XII. № 72.

Случай автора относится къ 3-лѣтнему дитяти. Изслѣдованіемъ обнаружено на правой сторонѣ, начиная отъ мѣстоположенія клыковъ, присутствіе сращенія всей внутренней поверхности щеки съ зубными отростками челюстей. Передній край сращенія прощупывается въ видѣ толстыхъ рубцовъ; свойства дальнѣйшаго сращенія не опредѣляются. Состояніе подвижности сустава не поддается изслѣдованію. Кожные покровы нормальны. Сведеніе челюстей настолько значительно, что шель едва пропускаетъ металлическій шпатель, а сращеніе настолько прочно, что не допускаетъ ни малѣйшаго движенія. Операция произведена въ три сеанса. Въ первый разъ послѣ отсепаровки сращенія черезъ наружный (отъ угла рта до передняго края m. masset.) разрѣзъ щеки (послѣ этого движеніе челюсти совершается свободно), сюда вложенъ перевернутый на ножкѣ (кожнымъ покровомъ внутрь) лоскутъ, выкроенный на боковой поверхности шеи, и укрѣпленъ 6-ю шелковыми швами. Разрѣзъ щеки у угла рта также зашитъ. Черезъ 2 недѣли лоскутъ въ полости рта прижиль и началъ принимать видъ слизистой оболочки. Второй сеансъ операции оттянулся вслѣдствіе заболѣванія ребенка корью и воспаленіемъ легкихъ. Въ этотъ разъ подсѣчено основаніе лоскута и закрытъ свищъ (мѣсто временной щели). Заключительнымъ моментомъ была пересадка передняго, завернушагося въ свищъ (съ внутренней поверхности) края лоскута на переднюю внутреннюю часть щеки (черезъ новый разрѣзъ). Результаты операции: ротъ раскрывается почти на 1,5 см. (по измѣренію между зубами); внутренняя поверхность правой щеки гладка, имѣетъ видъ