

слизистой оболочки, правая щека оттягивается отъ челюстей не много менѣ лѣвой.

П. Овчинниковъ.

Д. И. Татариновъ. *Къ казуистикѣ изсѣченія гортани при раковыхъ новообразованіяхъ.* „Хирургія“. т. XII. № 72.

При операціи надъ описываемымъ больнымъ гортань отсѣчена отъ трахеи на уровнѣ перстневидно-трахеальной связки и, отсепанная отъ пищевода и глотки, удалена послѣ вскрытія послѣдней вмѣстѣ съ надгортанникомъ. Трахеотомическая трубка введена въ трахею, въ пищеводъ черезъ наружную рану вставленъ зондъ. Послѣ операціонное теченіе весьма гладкое; зондъ удаленъ на 5-й день, швы сняты на 6-й. Черезъ 17 дней вставлена искусственная гортань Wolff'a; сначала больной могъ говорить лишь шопотомъ, но черезъ 10 дней голосъ сталъ громкимъ. Касаясь вопроса о сравнительномъ достоинствѣ голосовыхъ аппаратовъ, употребляемыхъ при изсѣченіи гортани, авторъ отдаетъ предпочтеніе гортани Bruns'a и особенно Wolff'a, такъ какъ послѣдняя даетъ голосъ наиболѣе пріятнаго тѣмбра. Надо наблюдать только, что бы во 1-хъ, канюля гортанной части аппарата не была ни слишкомъ длинною, ни черезъ чуръ короткою и во 2-хъ, язычекъ аппарата не былъ толстъ, что мѣшаетъ правильности произношенія.

П. Овчинниковъ.

М. С. Черемухинъ. *Объ инородныхъ тѣлахъ въ пищеводѣ.* „Хирургія“. т. XII. № 72.

Попаданіе инороднаго (отъ пищевыхъ продуктовъ до искусственныхъ челюстей) тѣла въ пищеводъ—явленіе, встрѣчающееся довольно часто—нерѣдко ведетъ къ серьезнымъ послѣдствіямъ, не исключая смертельнаго исхода. особенно въ томъ случаѣ, когда corpus alienum относится къ группѣ тѣлъ, способныхъ легко ранить ткани. Оставаясь въ пищеводѣ иногда подолгу (по нѣскольку лѣтъ), инородное тѣло тѣмъ не менѣ представляетъ серьезныя неудобства и во всякомъ случаѣ должно быть удалено. Поддаваясь въ большинствѣ случаевъ обычнымъ приемамъ—извлеченію черезъ ротъ или проталкиванію въ желудокъ, инородное тѣло можетъ иногда (если оно засѣло прочно или обладаетъ острыми краями, углами) требовать иного способа леченія. Въ этомъ случаѣ давнимъ способомъ была эзофаготомія—операція, % смертности при которой опредѣляется, по послѣднимъ статистикамъ, въ 21, 23, принимая въ соображеніе всѣ случаи,