

Dr. Kurt. Witthauer *Лѣченіе суставнаго ревматизма Колларголовыми клизмами* Diakonissenhaus zu Halle (Medizinische Klinik № 42 1907).

Автору, заведовавшему акушерскимъ отдѣленіемъ вышеупомянутой больницы, пришлось примѣнять съ успѣхомъ Kollargol при родильной піеміи (Pyämia puerperalis) сперва ввидѣ Unguentum Credé, а затѣмъ ввидѣ 2% и 5% Sol Kollargoli, при чемъ изъ 15 пациентокъ онъ потерялъ лишь одну. Примѣнивъ въ настоящемъ году колларголовую терапію въ случаяхъ суставнаго (стрептококковаго) ревматизма сперва въ ввидѣ клизмъ (100—200 граммъ) раствора 2:1000, авторъ остался очень доволенъ полученными результатами, такъ какъ очень быстро исчезали субъэктивные жалобы. Лишь въ тяжелыхъ случаяхъ концентрація раствора клизмъ повышалась до 3:1000 и лишь въ одномъ случаѣ наблюдалось легкое раздраженіе, быстро исчезнувшее отъ прибавленія къ клизмамъ 10—15 капель опія. Клизмы назначались въ теченіи 2—3 недѣль, при чемъ предварительно опорожнялся кишечный трактъ. Терапія была малоудовлетворительна или безрезультатна лишь въ случаяхъ смѣшанныхъ формъ или подагры. Въ противоположность Riebold'у получившему хорошіе результаты отъ примѣненія Kollargol'a при гонорройныхъ заболѣваніяхъ сустава, автору достигнуть этого не удавалось. Изслѣдовавъ дѣйствіе колларгола въ 25 случаяхъ, авторъ приходитъ къ слѣдующимъ выводамъ:

- 1) Суставные (стрептококковые) ревматизмы съ успѣхомъ лѣчатся клизмами (0,2—0,5 на 100—200 граммъ дистиллированной воды).
- 2) Лѣченіе слѣдуетъ продолжать еще нѣкоторое время послѣ изчезанія боли и лихорадки.
- 3) Клизмы рѣдко вызываютъ раздраженіе, въ противномъ случаѣ необходимо добавить 10—15 капель опія.
- 4) Лѣченіе имѣетъ также діагностическое значеніе, такъ какъ при безрезультатной терапіи, мы имѣемъ дѣло не съ истиннымъ стрептококковымъ ревматизмомъ, а со смѣшанной инфекціей, либо съ подагрой или съ осложненіями.

М. Э. Тицнеръ.