

РЕФЕРАТЫ.

Внутреннія болѣзни.

Dr. Friedrich Teichmann (Отдѣленіе проф. Stadelman Berlin). *Къ вопросу о дигалентерапіи* (Die Therapie der Gegenwart. май 1907).

Въ этой статьѣ Dr. Friedrich Teichmann дѣлится съ читателями своими наблюденіями надъ дѣйствіемъ дигалена. Въ большинствѣ случаевъ Digalen употреблялся per os. Въ большинствѣ это были случаи, въ которыхъ показаніемъ къ назначенію дигалена служило хроническая сердечная слабость съ затрудненнымъ наполненіемъ крови въ артеріяхъ и застоємъ въ венахъ. Такимъ образомъ Дигаленъ назначался при нарушеніяхъ кровообращенія въ случаяхъ стеноза и недостаточности клапановъ, при сердечной слабости въ теченіи хроническаго нефрита, затѣмъ при простой міодегенераціи. Дѣйствіе дигалена во всѣхъ этихъ случаяхъ было весьма удовлетворительное. Пульсъ дѣлался болѣе сильнаго наполненія и не частымъ, діурезъ повышался, одышка, отеки и трансудаты исчезали. Результатъ употребленія дигалена сказывался обычно на третій, рѣже на второй день. Болѣе скорое дѣйствіе дигалена, чѣмъ Inf. Digitalis Teichman не наблюдалъ. Optimum дѣйствія получался при восьмидневномъ употребленіи 3×1cem. Digalen'a. При болѣе продолжительномъ употребленіи Digalen'a наступали явленія раздраженія со стороны желудка, ввидѣ рвоты и отсутствія аппетита. Кромѣ вышеупомянутыхъ явленій ничто иное не наблюдалось, за исключеніемъ интоксикаціи въ одномъ случаѣ, каковую онъ приписываетъ нѣкоторымъ случайностямъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ употребленіе Digalen'a оказалось безрезультатнымъ.

Какъ извѣстно Digalen дѣйствуетъ еще только въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется достаточно функціонально способной субстанции для желаемого увеличенія сокращенія сердечнаго мускула. Поэтому

не получается желаемого результата при тяжелыхъ случаяхъ Myodegenerat'ii полисарки и т. д. Въ этихъ случаяхъ не только не наступало улучшенія, но появлялись всѣ признаки ухудшенія. Также противопоказывался дигалень при далеко зашедшихъ случаяхъ артеріосклерозовъ, въ особенности при склерозѣ вѣнечныхъ сосудовъ. Въ трехъ случаяхъ, гдѣ дигалень оказывался не дѣйствующимъ, наблюдалось улучшение отъ Diuretin'a, Theocinum patrio асеііsum. Teichmann, ввиду непріятныхъ для пациента манипуляцій и рѣзкой болѣзненности, не совѣтуетъ вводить подкожно Digalen. Ввиду болѣзненности столь же рѣзкой, какъ и въ случаяхъ введенія Digalen'a подъ кожу, Teichmann не совѣтуетъ его вспрыскивать въ мышцу.

Въ случаяхъ острой слабости сердца, а также въ тѣхъ случаяхъ хронической сердечной слабости, въ которыхъ требовалось получить быстрый эффектъ, вводился дигалень съ успѣхомъ въ вену. Быстро наступало повышеніе кровяного давленія, увеличеніе діуреза, удлиненіе діастолы и усиленіе систолы и т. д.

Въ случаяхъ рѣзко выраженного заболѣванія сердечнаго мускула, въ особенности связаннаго съ артеріосклерозомъ, авторъ предостерегаетъ отъ назначенія введенія въ вену дигалена.

М. Э. Тицнеръ.
