

Unger. (*Gonococcen in Blute bei gonorrhöischer Polyarthriti-*
tis. D. med. Woch. 1901, № 51).

Въ одномъ случаѣ гонорройнаго пораженія суставовъ авторъ нашель въ крови гонококковъ (что противорѣчитъ мнѣнію Finger, Sohn'a и другихъ, что гонококки не выносятъ $t^0 38^0$ и гибнутъ въ крови лихорадящаго ревматика) Для того, чтобы обнаружить въ крови присутствіе гонококковъ, нужно брать отъ лихорадящаго больного большое количество крови и разлить ее на удобную для роста гонококковъ питательную среду. Лучше брать въ данномъ случаѣ жирную питательную среду. Въ сообщаемомъ случаѣ были взяты 10 к. сант. крови изъ правой локтевой вены. 1 к. с. влили въ одну трубочку, 3 к. с. въ другую и 5 к. с. въ третью трубочку; питательной средой былъ сывороточный бульонъ. Въ первыхъ двухъ трубочкахъ жидкость осталась безъ измѣненій, въ третьей же, уже черезъ 48 часовъ образовалась голубоватая пленка, въ которой найдены были гонококки. На агарѣ также были получены колоніи гонококковъ.

Karwowski. *Ein Fall positivem Gonokokkenbefund in einem epididymitischen Abscess.* (Monatsht. f. pract. Derm. 1902, B. 35, № 11).

Авторъ описываетъ случай, гдѣ у 29-лѣтняго мужчины уретритъ осложнился воспаленіемъ придатка. Послѣдній процессъ долго не уступалъ терапіи и уже было подозрѣніе на туберкулезный, какое мнѣніе еще больше поддерживалось общимъ состояніемъ здоровья больного и данными наследственности, какъ вдругъ абсцессъ самопроизвольно вскрылся и бактериологическое изслѣдованіе излишка гноя указало на его гонорройную природу. Этотъ случай нахождения гонококковъ въ эпидидимическомъ абсцессѣ, седьмой по счету (авторъ пропустилъ одинъ случай—восьмой—реф.), подтверждаетъ, по мнѣнію автора, специфическую этиологію перелойныхъ воспаленій придатка, не опровергая возможности и другихъ причинъ, какъ то: травмы, нарушеній кровообращенія и т. д., вызывающихъ описываемое заболѣваніе даже и въ отсутствіи перелоя уретры.

Nobl. *Zur Histologie der blenorrhöischen Deferenitis und Epididymitis.* (Arch. f. Dermatologie und Syphilis, 1903, B. LXVII, H. 2).

При гистологическомъ обслѣдованіи органовъ больного, страдавшаго перелойнымъ эпидидимитомъ при жизни и умершаго во время существованія вышесказаннаго заболѣванія отъ ущемленія паховой