

въ глубину, не стѣсняясь кожными покровами. Вторая вмѣстѣ съ описаніемъ и демонстраціей оперативныхъ пріемовъ должна дать для каждаго изъ нихъ анализъ условій ихъ примѣненія. Для этого въ ея рукахъ, съ одной стороны, данныя анатомопографическія, съ другой—клинической опытъ и лабораторные эксперименты.

Д. И. Татариновъ. *О заднихъ цефаломахъ.*

Работами послѣдняго времени установлено два типа мозговыхъ грыжъ—exencephalia, представляющая выпячиваніе частей мозга и serphalosele или serphaloma, являющееся врожденнымъ тератоднымъ новообразованиемъ. Случаевъ заднихъ цефаломъ описано немного. Въ наблюдавшемся авторомъ случаѣ, относящемся къ 2-мѣсячному ребенку, образованіе опухоли замѣчено тотчасъ послѣ рожденія. При изслѣдованіи, величина ея = 27×19 см.; опухоль синевато-красноватого цвѣта, флюктуируетъ, просвѣчиваетъ, сидитъ на ножкѣ, окружностью въ 14,5 см. При операціи—круговой разрѣзъ по окружности ножки. Въ затылочной кости обнаружено небольшое отверстіе, которое послѣ вправленія выступающаго здѣсь мозгового вещества, закрыто лоскутами надкостницы. Теченіе и исходъ хороши. Хотя по клиническимъ признакамъ эта опухоль могла быть принята за meningocele, но микроскопическое изслѣдованіе стѣнки оправдываетъ названіе цефаломы. Стѣнка опухоли состоитъ отчасти изъ жировой ткани, отчасти изъ плотной соединительной, но мѣстами встрѣчаются участки невроглии.

П. В. Ильинъ. *Выворотъ Морганіева желудка.*

Названіе—«eversio sive prolapsus ventriculi Morgagni»—было дано заболѣванію слизистой оболочки Морганіева желудка, дающему картину опухоли, свисающей надъ голосовыми связками и вправимой въ желудочекъ. Позднѣйшія наблюденія, соединенныя съ патолого-анатомическими изслѣдованіями, показали, что такое названіе должно быть оставлено, и что патолого-анатомическая сущность заболѣванія состоитъ въ хронической гиперплазіи слизистой оболочки или желудка, или ложныхъ голосовыхъ связокъ. Поэтому заболѣваніе должно быть названо или chorditis vocalis hyperplastica или laryngitis lateralis hyperplastica или chorditis ventricularis inf. hyperplastica. Въ силу такого характера заболѣванія леченіе его сводится къ устраненію гипертрофіи. Помимо покоя органа, могутъ быть примѣнимы прижиганія (химическія и физическія) и изсѣченіе.
