

Д. Кузнецкій. *Рѣдкій случай колоторъзаной раны.*

Описываемый авторомъ случай интересенъ по нѣкоторымъ осложненіямъ, какими сопровождалось раненіе, и по прекрасному исходу, несмотря на тяжесть раненія и осложнений. Больной получилъ рану соответственно 7-му ребру на передней подмышечной линіи. При изслѣдованіи 7 ребро и 6 межреберье оказалось разрѣзанными, изъ раны выступаетъ (при выдыханіи) мутная съ кислымъ запахомъ жидкость; выслушивание лѣваго легкаго обнаруживаетъ отсутствіе дыхательныхъ шумовъ. Въ окружности раны подкожная эмфизема. При операціи (черезъ 22 часа послѣ раненія)—по изсѣченіи 8 см. 7-го ребра, полость плевры, откуда вытекло много вонючей, грязной жидкости, промыта горячимъ растворомъ хлористаго натра. На рану наложены швы, а въ полость введенъ тампонъ. Въ діафрагмѣ оказалась рана, длиною въ 3 см., которая зашита со стороны плевральной полости. Брюшная стѣнка вскрыта по наружному краю т. recti; въ полости оказалась та же жидкость. На лицо всѣ признаки перитонита. Рана желудка (около выхода), длиною въ 2 см. зашита двухъэтажнымъ швомъ; перитонеальная полость промыта, и рана зашита наглухо.—Со стороны брюшной полости (хотя рана заживала съ нагноеніемъ) исходъ операціи оказался удачнымъ,—всѣ явленія начинающагося перитонита быстро стихли, повидимому, безъ послѣдующихъ срощеній, такъ какъ у больного не было впослѣдствіи ни болей, ни запоровъ. Успѣхомъ этимъ, по автору, онъ всецѣло обязанъ энергичному промыванію хлористымъ натромъ, раннему примѣненію слабительныхъ и клизмъ. Со стороны плевральной полости дѣло шло не такъ гладко. Появился гнойный плевритъ задержавшій расправленіе легкаго что потребовало резекціи 4-хъ реберъ. Не смотря на это, полость плевры спалась лишь черезъ 4 слишкомъ мѣсяца. Но этимъ не окончилось леченіе. Присоединившійся каріозный процессъ въ хрящахъ и ребрахъ заставилъ сдѣлать больному еще 4 операціи, такъ что леченіе затянулось на пѣтый годъ. Не смотря на все, былъ достигнутъ полный успѣхъ,—больной получилъ полную возможность работать.

Л. Флеровъ. *Случай заживленія прободенной кишки подъ зажимающими пинцетами Рёан'а (ущемленная грыжа).*

При операціи по поводу ущемленной паховой грыжи, инкарцерированная петля тонкой кишки, найденная въ весьма дурномъ состояніи (матовая поверхность, явленія застоя, начальные участки гангрены), при манипуляціяхъ для отдѣленія срощеній ея съ грыжевымъ мѣшкомъ, прорвалась. Избѣгая первичной резекціи кишки при ущемленіяхъ, авторъ наложилъ на отверстіе два Рёан'овскихъ пинцета, и