

обстоятельство—не допустить задержки отдельляемого верхняго отделька кишечника, чтò было въ одномъ случаѣ автора. Къ устраниеню этого неудобства клонится предложеніе П. К. Бочкарева—прежде образованія канала сшить колѣна петли (двумя серозно-мышечными швами), образовать (разрѣзомъ между швами) общую полость и въ верхнемъ отдельѣ ея провести косой каналъ.

Проф. П И. Дьяконовъ. Къ ученію о желчнокаменной болѣзни.

При изученіи литературно-статистической стороны вопроса, бросается въ глаза неравномѣрное распределение количества оперируемыхъ по поводу желчно-каменной болѣзни. Россія принадлежитъ къ числу странъ, где это заболѣваніе очень мало распространено, на что указываютъ какъ данные патологоанатомическихъ вскрытий, такъ и больничные отчеты. Вопросъ о причинахъ этого явленія остается открытымъ.—Распознаваніе желчныхъ камней, несмотря на отчетливыя описанія симптоматологіи заболѣванія, часто затруднительно, благодаря возможности смѣщенія этихъ симптомовъ съ вызываемыми, напр., аппендицитомъ. Дѣлу распознаванія можетъ помочь рентгеноскопія, но необходимо пока еще дальнѣйшее развитіе техники въ этомъ направленіи.—Вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ клиницистовъ необходимо смотрѣть на присутствіе желчного камня, какъ на опасное страданіе, часто влекущее дурныя послѣдствія. Поэтому слѣдуетъ во всякомъ распознанномъ случаѣ прибѣгать къ оперативному лечению, и показаніемъ къ нему должно служить даже одно присутствіе камня.—Изъ трехъ оперативныхъ приемовъ, наичаше практикуемыхъ—холецистотоміи, холецистостоміи и холецистэктоміи—первый долженъ быть вовсе оставленъ. Наиболѣе удовлетворяетъ требованіямъ третій приемъ, который долженъ быть замѣненъ вторымъ, съ одной стороны, при существованіи непроходимости общаго желчнаго протока и съ другой—для дренажа системы желчныхъ ходовъ.—Цистикотомія и холедохотомія сравнительно рѣдко примѣняются (при локализаціи камней въ этихъ путяхъ).

Прив.-доц. В. А. Воробьевъ. О симптомахъ холелитіаза при страданіяхъ поджелудочной железы.

Хроническія страданія поджелудочной железы (хроническій панкреатитъ, камни), существуя иногда скрыто и не вызывая болѣзненныхъ симптомовъ, въ другихъ случаяхъ сопровождаются известнымъ