

Проф. Зеленевъ. *Къ казуистикѣ перелойнаго разлитаго кавернита.* (Русскій журн. кожныхъ и венерическихъ болѣзней, 1904, № 6).

Авторъ указываетъ на случай хронического безболѣзненнаго перелойнаго воспаленія пещеристаго тѣла. Въ его случаѣ было хроническое разлитое муфтообразное безболѣзненное утолщеніе всего кавернознаго тѣла съ рѣзкимъ уплотненіемъ и остальныхъ, еще не достигшихъ размѣровъ опухоли, частей пещеристаго тѣла. Онъ выскакиваетъ мнѣніе, что такие инфильтраты развиваются во время хронического перелоя, который существуетъ на лицо. Здѣсь, какъ и при всякомъ хроническомъ воспалительнѣмъ процессѣ можетъ образоваться соединительно тканное образованіе въ согрѣа cavernosa.

И. Г.

Нервныя болѣзни.

W. E. Taylor. *Случай неврита plexus brachialis cъ аутономіей.* „Revue neurologique“. 1904. № 4.

Авторъ сообщаетъ о своемъ наблюденіи, произведенномъ въ клиникѣ проф. De Jérine.

Больная швея, безъ какихъ либо указаній на бывшій сифилисъ. Заболѣваніе началось 14 лѣтъ назадъ, на 55 году ея жизни—сильными болями въ 4 и 5 пальцахъ правой руки; которые, постепенно усиливались, распространялись на всю руку. Периодъ болей продолжался нѣсколько недѣль, потомъ боли утихли и больная была въ состояніи заняться трудомъ. 6-ть лѣтъ спустя внезапно у нея обнаружились опять сильные боли въ кисти и предплечіи правой руки, что сопровождалось уже затрудненіемъ разгибанія 3-хъ пальцевъ, которыхъ оставались такимъ образомъ полусогнутыми.

Несмотря на примѣненіе электротерапіи втеченіе 4-хъ лѣтъ, развилась замѣтная атрофія мышцъ руки. Въ 1899 г. всѣ пальцы правой руки, кроме большого были почти неподвижны, а большой палецъ сохранилъ способность лишь къ весьма ограниченнымъ движеніямъ въ сторону флексіи, экстензіи и аддукціи; всѣ мускулы руки атрофированы, возвышенія thenar'a и hypotaenar'a отсутствовали; мускулы плеча и груди соотвѣтственной стороны также слегка уменьшены въ объемѣ, реакція перерожденія на электрич. раздраженіе. Остальные мускулы и рефлексы въ нормальномъ состояніи. Рядомъ съ этимъ отмѣчено: пониженіе чувствительности къ прикосновенію, боли, теплу въ области кисти, особенно 5 и 4 пальцевъ и въ б. слабой степени распространяющ. на всю руку; болѣзненность при давленіи нервовъ