

Д-ръ Р. А. Кацъ. Эзеринъ при страданіяхъ роговой оболочки. „Вѣстникъ Офтальмологіи“, 1901 г., ноябрь—декабрь.

Авторъ, не отрицая того, что атропинъ является весьма цѣннымъ средствомъ при леченіи тѣхъ кератитовъ, гдѣ пораженіе роговой оболочки сопровождается гипереміей или воспаленіемъ и радужной,— считаетъ назначеніе его при неосложненныхъ со стороны iridis воспаленіяхъ роговицы, по меньшей мѣрѣ, малодѣйствительнымъ, а иногда даже прямо вреднымъ, такъ-какъ съ назначеніемъ атропина не рѣдко процессъ въ роговице явно ухудшается: язва увеличивается, являются новые инфильтраты, а боли и раздраженіе нисколько не уменьшаются. Взамѣнъ атропина въ случаяхъ послѣдней категоріи онъ совѣтуетъ примѣнять эзеринъ, который, понижая внутрглазное давленіе и уменьшая, такимъ образомъ, напряженіе глазныхъ оболочекъ (слѣд. и роговой), препятствуетъ дальнѣйшему пропитыванію и изъязвленію роговицы и способствуетъ заживленію уже образовавшейся язвы. Такимъ образомъ, эзеринъ является полезнымъ при глубокихъ гнойныхъ язвахъ роговицы, при гнойныхъ изъязвленіяхъ роговицы со значительнымъ hydroprrionомъ, при периферическихъ инфильтратахъ роговой оболочки у взрослыхъ и у дѣтей, а такъ-же, какъ средство, сохраняющее роговую оболочку при первыхъ признакахъ ея гноинаго пораженія, въ особенности, при гноиномъ конъюнктивитѣ, гдѣ эзеринъ показанъ даже до появленія какихъ-либо патологическихъ измѣненій въ cornea для повышенія степени ея сопротивляемости блenniorrойному яду. Въ своихъ случаяхъ, которыми авторъ иллюстрируетъ сказанное, онъ примѣнялъ мазь изъ эзерина съ юдоформомъ по формулѣ: eserin-sulfur. o.03, jodoform. o.12 и vaselin. amer. fl. 6.0.

Б. Агафоновъ.

Д-ръ Ф. Т. Лукинъ. Случай остеомы глазницы. „Вѣстникъ Офтальмологіи“, 1901 г., іюль—октябрь.

Случай автора, наблюдавшійся имъ въ клинике проф. Fisch'a (въ Вѣнѣ), касается мальчика, 14-ти лѣтъ, у которого новообразованіе развилось постепенно въ 7 мѣс. послѣ ушиба правой $\frac{1}{2}$ лба. При изслѣдованіи можно было видѣть, что верхнее вѣко правого глаза опущено и внутренняя его $\frac{1}{2}$ вмѣстѣ съ бровью значительно выдается впередъ. Черезъ вѣко прощупывалась твердая, какъ кость, опухоль, поверхность которой была бугристая; кверху эта опухоль незамѣтно переходила въ лобную кость; кнутри граничила полуширообразнымъ, рѣзко выступающимъ краемъ съ костной частью носа; у виска такимъ же образомъ выдавалась передъ margo supraorbitalis; нижняя поверх-

ность шарообразна; при ощупываніи середины нижней части опухоли ощущалась боль (n. trigeminus). Кожа надъ опухолью нормальна и подвижна. Глазное яблоко при наружномъ изслѣдованіи найдено нормальнымъ, но нѣсколько выпяченнымъ и сдвинутымъ книзу и кнаружи, причемъ подвижность его кнаружи и книзу нормальна, кнутри сильно ограничена, кверху абсолютно невозможна. V. ос. d. = $\frac{3}{36}$, ос. sin. = $\frac{3}{60}$. При офтальмоскопированіи въ обоихъ глазахъ найдено retinitis pigmentosa. Послѣ операции, произведенной проф. Fusch'омъ, по отдѣленіи новообразованія долотомъ и вылущеніи его вмѣстѣ со стѣнкой лобной пазухи, глазное яблоко мало-по-малу приняло нормальное положеніе и движенія его возстановились полностью. Удаленная опухоль была распиlena и на распилѣ было видно ясно выраженное правильное строеніе компактной кости.

B. Агафоновъ.

ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ.

Л. Я. Слезингеръ. *Къ вопросу о цереброспинальномъ менингите и лечении его горячими ваннами.* „Дѣт. Медиц.“ 1901 г., № 4.

Приведя краткую историческую справку о распространеніи цереброспинального менингита и вкратце изложивъ этиологию, симптоматологию и исходы его, авторъ приводитъ исторію болѣзни трехъ больныхъ изъ дѣтского отдѣленія Еврейской больницы въ Одессѣ, леченныхъ горячими ваннами (t° ванны въ $30^{\circ}R$ постепенно повышались до $32^{\circ}R$). Всѣ трое больныхъ выздоровѣли, хотя у первого сильно пострадалъ слухъ, у второго значительно ослабѣла память. Ванны каждый разъ оказывали благотворное дѣйствіе, которое можно объяснить (Wolisch) отчасти отвлечениемъ крови отъ головного и спинного мозга, отчасти выдѣленiemъ токсиновъ благодаря потѣнію. Авторъ считаетъ горячія ванны лучшимъ болеутоляющимъ и успокаивающимъ средствомъ.

B. Зуевъ.
