

ность шарообразна; при ощупываніи середины нижней части опухоли ощущалась боль (n. trigeminus). Кожа надъ опухолью нормальна и подвижна. Глазное яблоко при наружномъ изслѣдованіи найдено нормальнымъ, но нѣсколько выпяченнымъ и сдвинутымъ книзу и кнаружи, причемъ подвижность его кнаружи и книзу нормальна, кнутри сильно ограничена, кверху абсолютно невозможна. $V. os. d. = \frac{3}{36}$,

$os. sin. = \frac{3}{60}$. При офтальмоскопированіи въ обоихъ глазахъ найдено retinitis pigmentosa. Послѣ операціи, произведенной проф. Fusch'омъ, по отдѣленіи новообразованія долотомъ и вылущеніи его вмѣстѣ со стѣнкой лобной пазухи, глазное яблоко мало-по-малу приняло нормальное положеніе и движенія его возстановились полностью. Удаленная опухоль была распиlena и на распилѣ было видно ясно выраженное правильное строеніе компактной кости.

Б. Алаоновъ.

ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ.

Л. Я. Слезингеръ. *Къ вопросу о цереброспинальномъ менингитѣ и леченіи его горячими ваннами.* „Дѣт. Медиц.“ 1901 г., № 4.

Приведа краткую историческую справку о распространеніи цереброспинального менингита и вкратцѣ изложивъ этиологію, симптоматику и исходы его, авторъ приводитъ исторію болѣзни трехъ больныхъ изъ дѣтскаго отдѣленія Еврейской больницы въ Одессѣ, леченныхъ горячими ваннами (t^0 ванны въ 30^0R постепенно повышалась до 32^0R). Всѣ трое больныхъ выздоровѣли, хотя у перваго сильно пострадалъ слухъ, у втораго значительно ослабѣла память. Ванны каждый разъ оказывали благотворное дѣйствіе, которое можно объяснить (Wolisch) отчасти отвлеченіемъ крови отъ головного и спинного мозга, отчасти выдѣленіемъ токсиновъ благодаря потѣни. Авторъ считаетъ горячія ванны лучшимъ болеутоляющимъ и успокаивающимъ средствомъ.

В. Зуевъ.