

грязныя ванны, обтиранія. Соленыя ванны черезъ день (не чаще), въ 28—29°R, не болѣе $\frac{1}{2}$ фунта соли на ведро, съ сидѣніемъ въ ней 8—15 минутъ, числомъ 20—40 ваннъ. Обтиранія смѣсью соли простой водки и воды у маленькихъ дѣтей губкой, у болѣе старшихъ простыней, съ растираніемъ ребенка до легкой красноты. Изъ внутреннихъ средствъ—различныя препараты желѣза, смотря по состоянію больного и по дѣйствию самого препарата: при хроническихъ катарахъ кишекъ *fer. carbonic.*, *f. lactic.*, *liq.*, *ferri sesqui chlorat.*, при отсутствіи аппетита и слабыхъ явленіяхъ диспепсін *chinin.-ferro-citrici*, при нервныхъ явленіяхъ на почвѣ анеміи *fer. bromat.* (быстро портится и не всегда хорошо переносится желудкомъ), при хроническихъ опухоляхъ лимфатич. железъ *syg. ferri jodat.* (2 или 3 раза въ день столько капель, сколько ребенку лѣтъ постепенно до тройного количества), при рахитѣ съ нервными явленіями *pyrophosph. ferri*, индифферентный препаратъ—*ferrocin*; изъ желѣзистыхъ минеральныхъ водъ Оренца, Левико (слабый), Спа и искусствен. пиро-фосфорнія желѣз. вода (дѣтямъ 7—12 л, во время завтрака и обѣда $\frac{1}{4}$ или $\frac{3}{4}$ бутылки въ день), Левико (содерж. мышьякъ) дѣтямъ 2—6 л. отъ 3 чайн. ложекъ до 4 десертн. лож. въ день. Гемоль, гемогаллоль, сангвиноль не выше обычныхъ препаратовъ желѣза. Мышьякъ полезенъ при анеміи, осложненной функциональными невротами, упорными сыпями, аденитами. При употребленіи *medullagen'a* и *ossagen'a* автору помогли болѣе гигиеническія мѣры, чѣмъ названныя препараты.

В. Зуевъ.

И. К. Конаржевскій. *Противодифтеритная сыворотка, какъ терапевтическое и профилактическое средство при коклюшѣ.*
Рус. Медици. Вѣстн. № 4 за 1902 г.

На основаніи 20 случаевъ примѣненія антидифтеритной сыворотки у коклюшныхъ больныхъ авторъ замѣтки «опредѣленно, точно, сознательно, фактически обоснованно» высказываетъ положенія: 1) достаточно двухъ много 3-хъ впрыскиваній (на 1000 един. антитокс.), чтобы время теченія коклюша ограничить лишь двумя недѣлями 2) предупредить стадій судорогъ 3) если же судороги наступаютъ, то послѣ 3-го впрыскиванія, какъ правило, быстро совершенно прекращаются 4) явленія коклюша рѣзко уменьшаются черезъ сутки послѣ впрыскиванія и совершенно исчезали въ началѣ 3-ей недѣли, а не рѣдко и въ концѣ второй 5) никакой особо-рѣзкой реакціи отъ впрыскиванія отмѣтить нельзя 6) впрыскиваніе здоровымъ дѣтямъ предупреждаетъ ихъ отъ заболѣванія. Авторъ употреблялъ сыворотку Инст. Эксперим. Медицины, впрыскивая съ промежутками (обычно) въ 2 или 3 дня.

В. Зуевъ.