

P. Keraual et Danjeau. *Состояніе глазного дна у прогрессиивно-параличныхъ.* „Arch. de neurol“. 1904. Mars.

Авторъ сообщаетъ данныя изслѣдованія глазного дна у 41 женщинъ, прогрессиивно-параличныхъ. У 4-хъ глазное дно оказалось совершенно нормальнымъ. У 9 картина представлялась мало характерной, въ видѣ лишь слабаго поблѣдненія папиллы. Въ 3-хъ сл.—неотчетливость контуровъ; въ 7 сл. отечное состояніе, блѣдность и неясность контуровъ папиллы; въ 11 сл. картина атрофіи. Наконецъ въ 7-ми сл. измѣненія являлись вовсе независимыми отъ прогрессиивнаго паралича (coloboma choroid., retinochoroid., staphyloma post и т. д.).

H. Carrier. *Первая клѣтка въ нормальномъ и патологическомъ состояніи. Гистологическія измѣненія нервныхъ центровъ при delirium toxi dutit. алкоголиковъ, delirium tremens и delirium acutum.* Paris 1904 г.

Содержаніе этого труда переданы I. Боуер въ отдѣлѣ библиографіи майской книги «Arch. de Neurol.» за настоящій годъ. Н. Carrier разсматриваетъ различныя психопатическія состоянія въ связи съ имѣющимися данными патологической анатоміи. 1-ю часть труда авторъ посвящаетъ критической оцѣнкѣ фактовъ, касающихся нормальной и патологической гистологіи нервной клѣтки, останавливая вниманіе на Niss'евскихъ тѣльцахъ, принадлежащей имъ функціи, различныхъ формахъ хроматолиза, затѣмъ на вопросъ о времени появленія въ нервныхъ центрахъ истинныхъ трупныхъ измѣненій и наконецъ на способъ приготовленія препаратовъ. Онъ дифференцируетъ патологическія измѣненія нервныхъ клѣтокъ, измѣненныя болѣзненнымъ процессомъ, въ зависимости ли отъ изнуренія или возраста. Здѣсь же излагаются результаты изслѣдованій автора по вопросу о старческомъ инволюціонномъ процессѣ, роли и функціи мелко-клѣточныхъ элементовъ, которыя инфильтрируютъ вещество мозга при многихъ патологическихъ состояніяхъ. Далѣе разсматриваетъ природу желтаго псевдо-пигмента, котораго нервныя клѣтки содержатъ въ изобиліи при delirium tremens.

Чтобы вѣрнѣе истолковать измѣненія, бывающія при delirium tremens, составляющемъ лишь эпизодъ, острый припадокъ хроническаго алкогольнаго состоянія, авторъ идетъ при своемъ анализѣ отъ наиболѣе простыхъ картинъ къ болѣе сложнымъ: приводитъ гистологическія измѣненія кортикальныхъ центровъ при хронической интоксикаціи алкоголемъ, бредѣ у алкоголиковъ втеченіе токсемій и инфекцій и т. д. Все это составляетъ 2-ую часть труда.

3 ч. посвящена изученію гистологіи собственно delir. tremens, причемъ вначалѣ авторъ сравниваетъ между собою въ цѣломъ картину