

имѣетъ конусообразный видъ съ діаметромъ основанія, равнымъ 6 см. На ощупь у основанія дов. плотна, у верхушки нѣсколько мягче. У основанія имѣется отдѣльный грибовидный выростъ. Справа подъ мышкою прощупывается полушаровидный отдѣльный узелъ; лимфатическіе узлы лѣвой подмышки увеличены, плотны, безболѣзненны. Исключая по теченію болѣзни доброкачественныя опухоли, при дифференціальной діагностикѣ между саркомой и ракомъ остановились на послѣднемъ на основаніи возраста больного и качества опухоли. Больной оперированъ, черезъ  $\frac{1}{2}$  года не обнаружено мѣстнаго рецидива.

---

**А. Орловскій.** *Къ казуистикѣ эхинококковъ съ рѣдкой локализацией.* Хирургія. т. XIII. № 78.

Авторъ приводитъ три встрѣтившіеся ему случая. Въ одномъ—у больной, которая явилась съ жалобой на заболѣваніе колѣннаго сустава, была распознана бугорчатка послѣдняго. При операціи обнаружилось пораженіе сустава эхинококкомъ, при чемъ оказалось, что разрушенію подвергся нижній эпифизъ бедра, кости же голени не затронуты. Произведена ампутація. Эпифизъ оказался весь разрушеннымъ, а костномозговой каналъ выполненнымъ пузырями эхинококка, которые и выскоблены до верхняго эпифиза. Во второмъ случаѣ была предположена операція вылушенія туберкулезно пораженнаго шейнаго лимфатическаго узла. Оказалась эхинококковая киста съ исходнымъ пунктомъ въ межмышечной клѣтчаткѣ. Въ третьемъ случаѣ былъ поставленъ діагнозъ нагноившейся атеромы въ подкожной клѣтчаткѣ лѣвой половины грудной клѣтки соотвѣтственно двумъ послѣднимъ ребрамъ. По литературнымъ даннымъ, эхинококкъ костей встрѣчается въ 2,2—6% случаевъ, а эхинококкъ подкожной клѣтчатки еще рѣже.

---

**С. Спасокукоцкій.** *Пластика мочевого пузыря изъ кишки съ образованіемъ искусственнаго мочепріемника при эктопіи.* Хирургія. т. VIII. № 78.

Имѣя больного съ эктопіею мочевого пузыря и остановившись изъ существующихъ принциповъ леченія этого уродства на отведеніи мочи въ кишечникъ; авторъ выполнилъ это слѣдующимъ образомъ. Круговымъ разрѣзомъ по границѣ кожи вокругъ отверстія пузыря стѣнки послѣдняго отдѣлены и отсепарованы отъ клѣтчатки на  $1\frac{1}{2}$  пальца. По остановкѣ кровотеченія, закрывъ пузырь и рану, вскрыли выше брюшную полость по *lin. alba*. Въ рану выведена S-Ro-