

В. П. Жуновскій. *Erysipelas neonatorum.* Нѣсколько случаевъ рожи и ея осложненій у новорожденныхъ. Дѣт. Мед. 1902 г. № 4.

Съ клинической стороны различаютъ у новорожденныхъ двѣ формы рожи: 1) рожа у септическихъ дѣтей и 2) у здоровыхъ; у послѣднихъ описаны даже эпидеміи. Наблюдались внутриутробныя зараженія плода. Кромѣ пупка входными воротами для str. erysipelatis могутъ служить различныя трещины кожи, ссадины, поврежденія во время родовъ и т. п. Авторъ приводитъ свои 5 случаевъ. Случай 1-ый. Рожа туловища, головы, лица, зѣва и глотки. Смерть на 16-ый день. Второй случай: рожа туловища, половыхъ органовъ и конечностей. Phlegmone purulentum. Peritonitis. Смерть на 20-ый день. Третій случай: Рожа пупочной области. Перитонитъ. Смерть на 7-ой день. Четвертый случай: рожа лица. Гнойное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ. Смерть. Еще до начала рожи найдена scleroëdema neonat. Приводятся результаты патолого-анатомическаго вскрытія всѣхъ 4 случаевъ. Пятый случай. Рожа спины, крестца и ягодиць. Обширный абсцессъ — отъ нижнихъ краевъ лопатки до крестца. Выздоровленіе. Лечение обычное.

В. Зуевъ.

Ал. Бѣлоусовъ. *Случай маляріи, симулировавшей эпилепсію.* Дѣт. Мед. 1902 г. № 4.

У гимназиста 12 л., свободнаго со стороны наслѣдственности нервныхъ и психическихъ болѣзней и сифилиса, появились сначала легкіе судорожныя припадки по 2—3 раза въ день, затѣмъ учащавшіеся до 20 и болѣе разъ въ сутки. Болѣзнь принята была за эпилепсію, но лечение препаратами брома пользы нисколько не приносило. Изслѣдованіе авторомъ крови на малярійные паразиты дало положительный результатъ (селезенка была незначительно увеличена). При леченіи хининомъ и мышьякомъ припадки скоро ослабѣли, стали рѣже и затѣмъ совсѣмъ прекратились.

В. Зуевъ.

Хирургія.

А. В. Бенкетовъ. *Изъ казуистикъ внутреннихъ ущемленій.* „Хирургія“, Т. XII, № 69.

Помимо нормально существующихъ въ брюшинѣ отверстій и кармановъ, могущихъ дать поводъ къ внутреннему ущемленію кишекъ, условія для того могутъ создаваться какъ хронически воспалительнымъ