

Д—ръ А. И. Сычевъ. *Случай остеомы глазницы.* („Вѣстникъ Офтальмологіи“, 1901 г., ноябрь—декабрь).

Въ случаѣ д-ра Сычева правый глазъ 24-хъ лѣтняго пациента былъ совершенно вытѣсненъ изъ орбиты и, находясь внѣ глазной щели, покоился на шекѣ въ области fossae caninae., глазъ былъ красный, болѣзненный при прикосновеніи, незрячій и имѣлъ на роговицѣ leucoma centrale. Въ области верхняго вѣка на $\frac{1}{2}$ сант. ниже середины верхняго орбитальнаго края находилось свищевое отверстіе, изъ котораго выходило отдѣляемое, но зондъ черезъ которое не проходилъ, давая ощущение кости. При ощупываніи пальцами черезъ верхнее вѣко глазница оказалось выполненной неподвижной опухолью, плотной, какъ слоновая кость. Величина опухоли съ куриное яйцо; приче́мъ она сливалась съ верхнимъ краемъ орбиты во внутренней $\frac{1}{3}$ его, нижній же край хорошо ощупать мѣшалъ болѣзненный глазъ. Вслѣдствіе сильной свѣтобоязни больной не могъ смотрѣть лѣвымъ глазомъ и жаловался на очень сильную боль въ правомъ глазу во всей головѣ. По словамъ больного, опухоль появилась лѣтъ 5 назадъ въ области внутренне-верхняго угла орбиты и вначалѣ больного особенно не беспокоила, такъ-какъ глазъ еще полгода назадъ видѣлъ и не болѣлъ. Такъ какъ нельзя было поручиться за отсутствіе проникновенія опухоли въ полость черепа, то авторъ отъ радикальной операціи отказался и рѣшилъ только энуклеировать глазъ и сдѣлать тарзорафію. Послѣ энуклеаціи оказалось, что опухоль покрыта фиброзной тканью, совершенно гладка, крайне тверда, вполне неподвижна и выполняетъ рѣшительно всю глазницу. Въ удаленномъ глазѣ никакихъ измѣненій кромѣ leucoma макроскопическаго не найдено.

Б. Агафоновъ.