

РЕФЕРАТЫ.

Внутреннія болѣзни.

Dr. Rubens. *О леченіи салициловыми препаратами введеніемъ въ вену.* (Deutsche mediz. Wochensch. № 3, 1905).

Авторъ приводитъ свои наблюденія надъ дѣйствіемъ салицилово-кислаго натра при эндовенозномъ введеніи его на суставной ревматизмъ, различныя невралгіи и плевриты. Для эндовенозного введенія авторъ рекомендуетъ слѣдующую, испытанную во многихъ случаяхъ, формулу Mendel'я: *Natrum salicylic.* 17, 5, *Coffein* 2, 5, *Aq. destillat* ad 100,0; для каждаго введенія берется 2 кб. с. раствора, содержащаго такимъ образомъ 0,35 *Natrü salicyl.* и 0,05 *Coffeini*. Методъ введенія очень простъ наложеніемъ эластическаго бинта на плечо достигается затрудненіе тока венозной крови, затѣмъ со всѣми предосторожностями,—очистки мѣста подлежащаго впрыскиванію, абсолютная чистота шприца и совершенное удаленіе изъ него пузырьковъ воздуха,—производится вколъ въ вену, затѣмъ бинтъ снимается и жидкость медленно вводится по направленію тока крови. При соблюденіи указанныхъ условій этотъ методъ по словамъ автора является совершенно безопаснымъ.

Премѣняя такое леченіе въ 60 случаяхъ суставнаго ревматизма, авторъ замѣчалъ быстро наступающее улучшеніе болѣзненныхъ припадковъ.—Продолжительность болѣзни этимъ способомъ однако не сокращается, но благодаря ему достигается во 1-хъ то, что быстрѣе затихаютъ боли а во 2-хъ, для полнаго излеченія процесса требуется введеніе въ организмъ значительно меньшее количество лекарственнаго вещества, слѣдовательно при этомъ способѣ больной не подвергается побочному дѣйствію лекарства; что неизбѣжно бываетъ отъ приѣма большихъ дозъ салициловокислаго натра при внутреннемъ его назначеніи, черезъ желудокъ. Особенно хорошіе и быстрые результаты получались при леченіи этимъ способомъ невралгій, напр. супраорбитальной, прошедшей совершенно послѣ трехъ впрыскиваній, а также невралгій при инфлуэнцѣ.

Съ такимъ же хорошимъ результатомъ авторъ примѣнялъ этотъ способъ при мышечномъ ревматизмѣ, сухомъ и экссудативномъ плевритахъ.

Этотъ способъ авторъ предлагаетъ, кромѣ того, какъ средство для установки въ нѣкоторыхъ случаяхъ дифференціальной діагностики между невралгіями обусловленными другими причинами напр. спондилитомъ и туберкулезнымъ пораженіемъ сустава. Въ такихъ случаяхъ лѣчение по указанному способу не оказываетъ дѣйствія на болѣзненный процессъ.

А. К.