

Проф. В. Ф. Чижъ. *Определение прогрессивного паралича (выделение его от смежных форм).* Журналъ невропатологіи и психіатрії имени С. С. Корсакова, кн. 1 и 2—1902 г.

Прогрессивный параличъ есть, по мнѣнию автора, заболеваніе всего организма, при которомъ равномѣрно поражаются болѣзнями процессомъ всѣ органы. Прогрессивный параличъ развивается всегда на почвѣ сифилиса, при чемъ ядъ сифилитической видоизмѣняется своеобразно: онъ перестаетъ дѣйствовать избирательно, т. е. не поражаетъ нѣкоторыя ткани и органы, а обусловливаетъ измѣненія рѣшиительно во всѣмъ организмѣ.

Этотъ ядъ названъ авторомъ метасифилитическимъ. Какъ съ патолого-анатомической, такъ и съ клинической стороны прогрессивный параличъ характеризуется равномѣрнымъ разрушениемъ всего организма: при немъ ни одинъ органъ не поражается по преимуществу и не щадится болѣзнью; также не сохраняется ни одной функции, и ни одна функция не разрушается по преимуществу. По мнѣнию автора, для прогрессивнаго паралича характерно то, что при немъ не наблюдается фокусныхъ пораженій, что рѣзко отличаетъ прогрессивный параличъ отъ смежныхъ клиническихъ формъ: *lues cerebro-spinalis* и *dementia e laesione cerebri organica*; при этихъ послѣднихъ имѣются всегда фокусныя пораженія. Кромѣ того, при прогрессивномъ параличѣ и психической функции мозга разрушаются равномѣрно, между тѣмъ при *dementia e laesione cerebri organica* и *lues cerebro-spinalis* нѣкоторыя психическая функции сохраняются, другія же нарушаются по преимуществу. Въ теченіе прогрессивнаго паралича, по мнѣнию автора, наблюдается постепенное нарастаніе болѣзнями явлений, а продолжительныхъ остановокъ не бываетъ.

Это послѣднее обстоятельство также отличаетъ прогрессивный параличъ отъ *dementia e laesione cerebri organica* и *lues cerebri*, при которыхъ часто наблюдаются продолжительные остановки въ теченіе болѣзни. Апоплектические и эпилептические припадки, наблюдающиеся въ теченіе прогрессивнаго паралича, зависятъ отъ временныхъ выпотовъ.

B. Колотинскій.

Приватъ-доцентъ Вл. Сербскій. *Къ вопросу о раннемъ слабоуміи. (Dementia praecox).* Журналъ невропатологіи и психіатрії имени С. С. Корсакова, 1902 г., кн. 1 и 2.

Въ первой части своей статьи авторъ рассматриваетъ современное состояніе вопроса о вторичномъ слабоуміи и доказываетъ, что группа психозовъ, известныхъ подъ названіемъ «вторичнаго слабоумія» должна быть оставлена въ классификаціи душевныхъ болѣзней.