

И з п р а к т и к и.

К казуистике ложного женского гермофродитизма.

Проф. Ю. М. Иргер (Минск).

Мы решили опубликовать данный случай, так как он представляет несомненный интерес.

Больная Р. П., 22 лет, колхозница, поступила в 1-ю хирургическую клинику Белорусского мединститута 26/V 1935 г. с жалобами на образование в области клитора полового члена, препятствующего половому акту.




Рис. 1.

По словам больной, с раннего детства она обратила внимание на появление в области клитора образования, напоминающего мужской половой член. К 17-летнему возрасту член „оформился“ в полной мере и нередко эрегировал. Больная никогда не менструировала. С 15-летнего возраста чувствовала влечение к мужчинам; влечения к женщинам никогда не было. 20-ти лет она вышла замуж. Детей не было. Живет нормальной половой жизнью, но во время сношения ее „половой член“ эрегирует и препятствует в ряде случаев нормальному половому акту. Половой акт закан-

чивается оргазмом. Со стороны наследственности никаких отклонений от нормы не обнаружено.

Как видно из прилагаемых фотографий, больная по внешнему виду—женщина. Грудные железы выражены не в достаточной степени.

При исследовании половой сферы обнаружено следующее: На месте клитора видно образование, точно напоминающее собою мужской половой член; в незрегированном состоянии длина его доходит до 5 см, а в эрегированном до 8—9 см. В месте, соответствующем наружному отверстию уретры, имеется слепое отверстие. Большие и малые половые губы хорошо выражены. Уретра расположена выше влагалища в нормальном месте. Глубина влагалища нормальная. Однако при пальцевом исследовании обнаруживается атрофия матки, яичники не прощупываются. Растительность на лобке женская. Со стороны других органов никаких отклонений от нормы не обнаружено.




Рис. 2.

28/V больная была нами оперирована, причем ей была произведена ампутация полового члена. Во время операции обнаружилось, что член состоит из хорошо выраженных кавернозных тел; кавернозных тел уретры не обнаружено. Длина его — 5 см. На 7-й день были сняты швы, и довольная результатом операции больная выписалась.