

НОВЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Кутизон

Отечественный синтетический противогриппозный препарат является тиосемикарбазоном р-изопропил-бензальдегида. Показан при всех формах вирусного гриппа у взрослых и детей. Он применяется внутрь и назначается взрослым по 0,005 три раза в день в течение трех дней, а детям 3—4 дня по 1 табл. 3 раза в день в следующих разовых дозах: от года до 3 лет — 0,001, от 3 до 5 лет — 0,0015, от 5 до 7 — 0,002, от 7 до 10 — 0,003, от 11 до 14 — 0,004. Противопоказанием для применения кутизона служат заболевания печени.

Редергам

Раствор дигидрированных алкалоидов спорыньи.

Показан при стенокардии, гипертонической болезни, мигрени, болезни Рейно, облитерирующем тромбо-ангите, перемежающейся хромоте.

Изготавливается в ампулах по 1 мл (содержит 0,3 мг вещества), в растворе (в 1 мл — 1 мг) и в таблетках (0,25 мг).

Вводится подкожно или внутримышечно от 1 до 3 ампул в день в зависимости от реакции больного на препарат.

До начала систематического лечения следует проверить реакцию больного на введение небольших доз препарата.

При парэнтеральном введении во избежание ортостатического коллапса больные до инъекции и не меньше 2 ч. после нее должны находиться в постели.

Раствор принимают и внутрь, начиная с 5 капель на прием, 3 раза в день, постепенно доходя до 20—35 кап. (60—105 кап. в день) — определяют эффективную индивидуальную дозу. Длительность приема — 1—3 месяца. Можно комбинировать прием внутрь с инъекциями от 0,3 мл (начальная доза) до 2 мл в день.

Таблетки кладутся под язык. Начальная доза — 1 табл. в день, постепенно повышают число таблеток до 7—8 на день, подбирая таким образом эффективную индивидуальную дозу.

Препарат противопоказан при гипотонии, выраженном атеросклерозе, при органических поражениях сердца, при нарушении функции почек, в старческом возрасте.

Гексаметон

Показан при гипертонической болезни, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, спастических состояниях кишечника.

Противопоказан при ослаблении миокарда, поражении сосудов сердца и мозга, при болезнях почек.

Для инъекций применяется бромид гексаметона (ампула в 1 мл содержит 0,25 мг вещества) и в драже — хлорид гексаметона.

Препарат следует применять в больничной обстановке. Начинать с инъекции $\frac{1}{2}$ мл (0,125 мг) подкожно или внутримышечно. Гипотензивный эффект наступает через 30—60 мин. У индивидуально чувствительных лиц может произойти падение кровяного давления до коллапса, когда следует применить адреналин или эфедрин в виде инъекции. Поэтому после инъекции препарата во избежание осложнений больной должен находиться в постели 2—3 часа под наблюдением.

Как проявления побочного действия препарата возможны расстройства зрения и запор. При хорошей переносимости препарата можно вводить до 4 ампл. в день. Действие драже непостоянно.

Препараты наперстянки

(чистые гликозиды)

Дигитоксин — 0,1 мг, в драже.

Начинают с 4—5 штук в день, постепенно снижая в течение недели до 1 драже в день.

Ланакордол — смесь кристаллических гликозидов А, В и С — выпускается в ампулах и свечах.

Ампула в 2 мл содержит 0,4 мг глюкозидов, свеча — 0,5 мг.
Следует соблюдать осторожность при одновременном назначении кальция и морфина.

Пелентан

Антикоагулянт, применяется в таблетках, содержащих 0,3 препарата. Начинают с приема 3—4 таблеток в день, постепенно сходя к концу недели до 1 таблетки. Необходим контроль за уровнем протромбина. При появлении кровотечений — немедленная отмена препарата, переливание свежей крови, введение витамина К.

Новурит

Диуретик. В 1 мл содержит 0,1 $C_{14}H_{24}O_5NHgNa + 0,045$ теофилина, ртути — 39,4%.

Применяется по 1—2 мл внутримышечно или внутривенно 2 раза в неделю. Начальная доза 0,5—0,75 мл. Подкожно вводить нельзя. Внутримышечно вводится длинной иглой в ягодичную область.

Диуретический эффект при внутривенном введении наступает через 3—6 часов, при внутримышечном через 6—8 ч. Повышенный диурез длится сутки, иногда и больше. Препарат лишен побочного действия и не кумулируется.

Противопоказан при гломерулонефрите, диаррее и кишечных кровотечениях.

Тетрациклин

Антибиотик, применяемый внутрь (в таблетках, капсулах, облатках). Лучше других антибиотиков этого ряда переносится больными и дает более высокую концентрацию в крови.

Показан при лечении пневмоний, подострого септического эндокардита, бактериальной и амёбной дизентерии, коклюша, гонорреи, бруцеллеза, туляремии, сыпного тифа, трахомы, пситтаккоза, а также перитонитов, хирургического сепсиса. При тяжелых состояниях больных комбинируется с пенициллином и стрептомицином.

Местно применяется при лечении ожогов, флегмон, маститов, абсцессов.

Таблетки содержат от 100 до 150 мг препарата. Принимаются за полчаса до еды или через час после приема пищи. Запиваются водой.

Суточная доза для взрослого — 2,0, детям суточная доза до 0,025 на 1 кг веса.

Противопоказаний не имеет.

Татаптекоуправление

Литературно-технический редактор — Б. С. Лупандин

Технический редактор — А. Т. Акишин

Сдано в набор 22/XII-1958 г. Подписано к печати 7/III-1959 г. ИФ 01078. Формат бумаги 70×108¹/₁₆.
Печатн. листов 6,5. Кол. знаков в 1 листе 68.100. Заказ № 0307. Тираж 2 800.

Типография Татполиграфа Министерства культуры ТАССР. Казань, ул. Миславского, д. № 9.