

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Дикаптол-хиноин¹

Применяется при отравлении ртутью, мышьяком, висмутом, золотом, кадмием (препаратами и химическими соединениями, содержащими эти элементы).

Выпускается в ампулах по 1 мл. Каждая ампула содержит 0,1 димеркаптопропанола и 0,2 бензил-бензоата, растворенных в масле. Вводится только внутримышечно достаточно глубоко.

При острых отравлениях вводят по 1 амп. через 4 часа (всего 4—6 амп.) в первый день, по 1 амп. через 8 часов — на второй, третий и четвертый день. Димеркаптопропанол вступает в химическую связь с токсическим элементом, а это комплексное соединение удаляется из организма с мочой.

Препарат необходимо иметь во всех лечебных учреждениях, оказывающих скорую и неотложную помощь. Эффект тем выше, чем быстрее после отравления вводится препарат.

Введение препарата не исключает применение симптоматической терапии.

Келлин

Келлин-хромон, получается из культивируемого в СССР растения Амми зубная.

Применяется в таблетках по 0,02, суточная доза 0,06—0,12. Rp: Khellini — 0,02 Dtd. № 25 in tabl. S. по 1—2 таблетки 2—3 раза в день после еды.

Назначается при стенокардии и бронхальной астме. При стенокардии цикл лечения — 2—3 недели. Лечебный эффект проявляется на 5—7 день приема препарата. Побочные явления в виде тошноты, ухудшения самочувствия встречаются редко, проходят при снижении разовой или суточной дозы.

Противопоказан при резко выраженных явлениях недостаточности кровообращения.

Паниверин

Рарaverin nikotinicum. Выпускается в ампулах (0,09 препарата в 2 мл) и в таблетках по 0,1. Назначается при спазмах сосудов, облитерирующем эндартериите. Таблетки применяются на голодный желудок от 1 до 3 на прием 2 раза в день. Средний курс лечения — 4—6 недель.

Раствор вводят подкожно или внутримышечно, но (медленно!) можно вводить и внутривенно и внутриартериально (при облитерирующем эндартериите).

Даукарин

Экстракт из семян моркови. По действию сходен с папаверином. Выпускается в таблетках.

Rp: Dausarini 0,02. Dtd № 25 in tabl. S. по 1 табл. 3—5 раз в день за 30 мин до еды.

Терапевтический эффект наступает через 3—5 дней после начала приема препарата. Обычно курс лечения длится 2—4 недели. Побочным действием не обладает.

Депаркин

Обладает сильным противогистаминным действием, сравнительно сильным парасимпатолитическим, угнетает передачу возбуждения в вегетативных ганглиях. Успешно используется в анестезиологии обычно в комбинации с другими фенотиазиновыми или иными препаратами; облегчает начало и течение анестезии.

Показан при паркинсонизме; для потенцированной анестезии; при моторных реакциях у психических больных.

¹ Есть аналогичный лучший отечественный препарат „Унитиол“, легко растворимый в воде, который можно вводить и внутривенно, так как при этом будет быстрее идти процесс дезинтоксикации организма. — П р и м. р е д.

Противопоказан при болезнях печени, почек, поражении венечных сосудов.

Применяется в драже по 0,05 или 0,25.

Назначается при неврологических заболеваниях, начиная с 1 драже в день и доходя до 10 драже на 10 день, в случаях хорошей переносимости препарата. Лечение проводится под контролем общего состояния и картины крови. При сонливости и общем психомоторном торможении дозы снижаются. При потенцированной анестезии вопрос о дозе решается индивидуально.

Диафиллин глютеозум

(Diaphillin gluteosum)

Выпускается в ампулах по 1 мл, в которой содержится 0,24 theophyllin — aethylenediamin и 0,01 poscain. Применяется только внутримышечно, по одной ампуле ежедневно или через день. Показан при всех видах нарушения кровообращения и отеках, как при поражениях сердца, так и при поражениях почек.

Гинофорт

(Gynofort)

Выпускается в ампулах по 1 мл, содержащих по 0,5 мг тартарата эрготамина и в флаконах по 10 мл, содержащих по 1 мг тартарата эрготамина в 1 мл.

Применяется при меноррагиях, метроррагиях, послеродовых кровотечениях по 1/2—1 ампл. внутримышечно или внутрь по 15—30 кап. 2—3 раза в день.

Пипераскат

Выпускается в таблетках по 0,3. Применяется при энтеробиозе и аскаридозе. Взрослым назначается по 2 таблетки 3 раза в день после еды в течение 6—7 дней.

При энтеробиозе после недельного перерыва курс повторяют. При аскаридозе курс повторяют через 3 дня после первого. Слабительные даются только в случае запоров.

Детям от 2 до 6 лет дают по 2 таблетки 2 раза в день. Детям менее 2 лет дают по 1 таблетке 2 раза в день.

Как побочные явления отмечаются общее недомогание, понос. В таких случаях делают перерыв в курсе на 3—4 дня или уменьшают дозы.

Противопоказан при тяжелых сердечных заболеваниях, острых заболеваниях печени и почек.

Диодон

Органическое вещество, содержащее около 50% йода. Применяется как контрастное средство для рентгенологического исследования почечных лоханок, мочеточников, мочевого пузыря, и также кровеносных сосудов и сердца.

К препарату приложена подробная инструкция.

Татаптекоуправление

НОВЫЕ КНИГИ

Г. Ф. Ланг. Болезни системы кровообращения. Медгиз, 1958. 496 стр. 23 р. 85 к.

Ф. Г. Углов. Рак легкого. Медгиз, 1958. 358 стр. 20 р. 35 к.

Р. Р. Макаров. Внематочная беременность. Медгиз, 1958. 126 стр. 5 р. 65 к.

А. А. Ступницин. Пенициллинотерапия больных сифилисом. Медгиз, 1958. 208 стр. 7 р. 25 к.

М. И. Певзнер. Основы лечебного питания. Медгиз, 1958. 582 стр. 26 р.

Л. А. Зильбер. Основы иммунологии. Медгиз, 1958. 598 стр. 28 р. 70 к.

А. Н. Марзеев. Коммунальная гигиена. Медгиз, 1958. 554 стр. 14 р. 60 к.

М. Л. Краснов, Н. Б. Шульпина. Лекарственный справочник врача-офтальмолога. Медгиз, 1958. 112 стр. 3 р. 75 к.

Руководство по общей онкологии. Под редакцией проф. Н. Н. Петрова. Медгиз, 1958. 368 стр. 14 р. 40 к.