

III. Д-р П. Д. Буев. „К гистологическим исследованиям носовой перегородки после подслизистой резекции ее по Killian'у“. Экспериментальное исследование.

Автор провел ряд экспериментальных наблюдений на кроликах и собаках с подслизистой резекцией хряща носа по Killian'у. Давность наблюдений равнялась 1—3—6—9 и 12 месяцам. Ни в одном микроскопическом препарате полной регенерации хряща не наступило, дефект даже и через 1 год заполнился фиброзной соединительной тканью. Разноречивость взглядов в научной литературе по этому вопросу автор объясняет размерами резецированного хряща, которые будут обратно пропорциональны его регенерирующими свойствам. (Автореферат).—Прения: д-ра Лебедевский, Чудносоветов, Герасимов и Вольфсон и проф. В. К. Трутнев.

IV. Д-р И. Ф. Герасимов продемонстрировал больного с саркомой носоглотки, развивавшейся в течение 1 $\frac{1}{2}$  лет; за последние 3 недели опухоль резко увеличилась и дала метастаз на шее.—Прения: проф. В. К. Трутнев выразился за возможность оперативного лечения у показанного больного.

Административная часть заседания: I. Организовано местное оргбюро по созыву IV Всесоюзного Съезда Р-Л-Отиатров в г. Ленинграде в составе: председатель проф. Трутнев, члены: д-ра Лебедевский Б. Н., Яхонтов С. П. и Голланд Б. С. П. Программными темами Съезда признаны желательными следующие: 1) профессиональные заболевания верхних дыхательных путей, 2) придаточные полости носа. Кроме того, для специалистов г. Казани желательно освещение на Съезде вопросов: а) о лечении хронических гнойных отитов, б) о применении трахеобронхоскопии с лечебной целью при легочных заболеваниях.

Секретарь д-р Касторский.

### Научные собрания врачей Государственного института для усовершенствования врачей имени В. И. Ленина в Казани.

121-е собрание 20 мая 1930 г.

1. Д-р Н. А. Бирячев демонстрировал редкий случай *lues gravis mutilans*.

Больная крестьянка, 30 лет, 5 лет тому назад у нее заболело горло, лечилась полосканием. Через 1 $\frac{1}{2}$  года на левой голени появился язвенный процесс, постепенно распространявшийся на тыльную поверхность голени. При поступлении у больной, помимо глубоких изменений и разрушений со стороны носоглотки, отмечается, что левая голень, начиная со средней трети заканчивается культий с выступающими большой и малой берцовыми костями. На оставшейся части голени над выступающими костями имеется язвенная поверхность; края язвы неправильной формы. R. W. и S. G++. Под влиянием специфической терапии уже в первые две недели язвенная поверхность зарубцевалась, малая берцовая кость вследствие омертвления вскоре выпала, а через 1 $\frac{1}{2}$  месяца отделилась на  $\frac{2}{3}$  и большая берцовая кость. Случай поучителен тем, что диагноз сифилиса не был своевременно распознан, несмотря на то, что больная обращалась за помощью в участковую больницу, где ей не была назначена специфическая терапия, которая могла бы предотвратить больную от инвалидности (потеря части голени). Докладчик на основании этого случая считает: 1) что при всяком язвенном процессе следует, помимо других этиологических моментов, иметь в виду и сифилис, 2) лечение сифилиса на участке должно быть расширено. Прения: приват-доценты И. И. Русецкий, Р. Я. Гасуль, С. Я. Голосовкер и д-р А. Гринбарг.

2. Д-р В. А. Преображенская. Об истерическом амаурозе.

Сообщено о 6-ти случаях слепоты, наблюдавшихся докладчицей в гор. Курске, причем два самовнушений кратковременной слепоты на один глаз, один ятрогенной слепоты у крестьянина, два случая слепоты, связанной с родами. У всех больных излечение наступило на 1—2 день посещения амбулатории по глазным болезням. Шестой случай макро- и микропсия передан на лечение в психо-диспансер. Прения: приват-доценты И. И. Русецкий, Р. И. Лепская, проф. В. Е. Адамюк.

3. Приват-доцент О. А. Герман. Бактериологическое исследование крови при *endocarditis lenta* и других септических заболеваниях.

Из 7 больных с полным симptomокомплексом для end. lenta прижизненно найдено в крови у одного *streptoc. viridans* и у 2-х других—пневмококки. Из