

Одному больному с двусторонней невралгией V нерва вмешательство проведено сразу с обеих сторон.

Во время операции у 31 больного получена цереброспинальная жидкость, в двух случаях горячую воду вводили при отсутствии ликвора. Никаких осложнений во время вмешательства и после него не отмечено. У 9 больных после операции в течение 2 суток была гипертерmia, головная боль, которые быстро проходили при соответствующем лечении. Среднее количество койко-дней — 11,6.

У одной больной через 1 год 8 мес. после операции было до 4—6 легких приступов боли в день в зоне иннервации 1-й ветви левого тройничного нерва. Во время поступления больной на лечение в первый раз приступов боли в 1-й ветви не было, а потому орбитальные волокна не разрывались. У остальных пациентов рецидивов не наблюдалось.

У 1 больного с невралгией всех трех ветвей V нерва произведено полное разрушение чувствительного корешка и возник нейропаралитический кератит, который удалось ликвидировать консервативными мерами. У всех больных в той или иной степени был затронут при вмешательстве двигательный корешок тройничного нерва и возникал парез жевательной мускулатуры на стороне операции, который ликвидировался через 6—8 мес. Легкие парестезии в зонах нарушенной чувствительности были почти у всех больных, но не причиняли им значительного беспокойства.

УДК 616—056.3

Г. Ананьева и Ю. Ананьев (Чебоксары). Осложнения при лечении пенициллином

Несмотря на редкость осложнений пенициллотерапии, каждый новый случай напоминает врачей, заставляя более внимательно подходить к инъекциям пенициллина.

Приводим наши наблюдения.

1. Р., 28 лет, по поводу правосторонней пневмонии произведена инъекция пенициллина (100 000 ед.) внутримышечно. Сразу появилась тошнота, небольшая слабость, которые быстро прошли. Через 4 часа больному повторно ввели пенициллин в той же дозе. Через 1—2 мин. возникло затемнение сознания, резкая слабость, затруднение дыхания, зуд кожи, головная боль, озноб, сильная потливость. Резкая гиперемия кожи всего тела, выраженный отек языка, губ, ушей. Тоны сердца глухие, пульс пониженного наполнения и напряжения, АД 60/40 мм.

Немедленно были введены кофеин, камфара, хлористый кальций, димедрол, преднизолон. Состояние больного постепенно улучшилось. Через 2 часа пульс 78, АД 110/70 мм.

2. Т., 17 лет, поступил с активной фазой ревматизма. В течение 20 дней проводились внутримышечные инъекции пенициллина по 100 000 ед. через 4 часа.

В связи с появлением абсцесса в области правой стопы через 4 дня после отмены пенициллина он вновь был назначен по 150 тыс. ед. 4 раза в сутки. Через несколько минут после первой же инъекции пенициллина на коже лица, груди, живота появилась обильная уrtикарная сыпь, отек Квинке. Больному назначены димедрол и хлористый кальций. Явления отека Квинке и сыпи на теле держались в течение 5 дней, постепенно снижаясь в интенсивности.

УДК 616—001.4

Д. М. Церенцян (Горловка). Заклеивание послеоперационных ран kleem БФ-6

Мы с 1965 г. применяем клей БФ-6 для заклеивания послеоперационных ран. Клей обладает приятным запахом, по консистенции близок к глицерину, на воздухе быстро густеет, образуя желтую прозрачную эластичную пленку. Он стерileн. Проведенные у нас исследования смывов с кожи после удаления пленки из клея через 3—5 дней оказались стерильными.

Методика применения. После обычной обработки раны, тщательного гемостаза и наложения швов на кожу стеклянной палочкой наносится тонкий слой клея по ходу послеоперационной раны с захватом кожи от краев ее на 1—2 см с каждой стороны. Через 3—5 мин. клей высыхает, образуя прозрачную желтоватую эластичную пленку, которая плотно удерживается на послеоперационной ране в течение 5—7 дней. При этом имеется возможность постоянно наблюдать за раной. Если клей применен после обработки ран на лице и кистях рук, то пленка не снимается и во время туалета больных.

При наступлении сроков снятия швов пленка легко снимается пинцетом всем слоем либо к этому сроку самостоятельно начинает отслаиваться. Отеков, гиперемии кожи и других воспалительных явлений в послеоперационной ране под пленкой не отмечалось. После снятия швов послеоперационный рубец снова заклеивают на 5—8 дней. Мы применяли клей у 340 больных, осложнений не наблюдали.

Клей нельзя наносить на загрязненные раны, воспаленную кожу и при кровотечении из раны.