

И., 11 месяцев, поступил 11/IV 1962 г., через 16 дней после ритуального обрезания. Через 7 дней ранка зажила, но ребенку стало почти невозможно мочиться. На конце полового члена имеется твердый рубец с точечным отверстием в центре. 13/IV-62 г. под местным обезболиванием рассечены по тыльной поверхности оба листка до sulcus corporarius; у наружного отверстия мочеиспускательного канала крайняя плоть отсечена от головки (т. к. оказалась рубцовой сращенной с ней) и оттянута к корню penis'a; круговое сечение плоти; швы на листки и рану вокруг мочеиспускательного канала. Выздоровление.

Б., 15 дней, 18/III-60 г. в 10 часов утра было сделано ритуальное обрезание, ранка присыпана стрептоцидом и риванолом. Началось сильное кровотечение, и к вечеру ребенок умер. По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила от «острой кровопотери».

Н., 11 дней, и З., 11 месяцев, умерли по этой же причине в 1961 г.

УДК 615 777

П. А. Лаврентьев, В. Г. Сальников и С. Д. Анисин (Казань), М. П. Никитина (Камбарка). Опыт применения диметилдихлорвинилфосфата (ДДВФ) в борьбе с постельным клопом

В настоящее время химическая промышленность страны выпускает большое количество разнообразных фосфорорганических препаратов, применяемых для борьбы с вредными насекомыми. К числу таких препаратов относится диметилдихлорвинилфосфат (ДДВФ).

Нами ДДВФ испытан в жилых помещениях для борьбы с клопами в июле 1964 г. в г. Камбарка Удмуртской АССР. Обработке были подвергнуты квартиры в бревенчатых рубленых домах. Внутренние стены некоторых домов были покрыты сухой штукатуркой, а другие оклеены обоями. Несмотря на то, что до этого квартиры обрабатывались дустом ДДТ, гексахлорана, дезинсектаем и керосином, уменьшения количества клопов не было достигнуто. При осмотре помещений перед обработкой всегда находили большое количество насекомых на различных стадиях развития.

Был применен 0,05% раствор ДДВФ в дозе 50—150 мл на 1 м² площади в зависимости от адсорбирующей способности обрабатываемой поверхности. Перед приготовлением рабочего раствора ДДВФ растворяли в ОП-10 в соотношении 1:1 и из этого готовили водный рабочий раствор. Перед дезинсекцией из помещения выселяли жильцов и убирали все продукты питания. Постельное белье и мебель оставляли, обои со стен не снимали. Обработку помещений производили из гидропульта ГС-2М. Опрыскивали все вещи и предметы, находящиеся в помещениях (постельные принадлежности, одежду, белье, книги), за исключением столовой посуды. Дезинсекцию помещений проводили в защитных очках и хлопчатобумажных комбинезонах при открытых дверях и окнах. По окончании дезинсекции помещения закрывали и пользоваться квартирой разрешали не раньше чем через 24—48 часов после хорошего проветривания.

Повторное заселение клопами обработанных квартир не было отмечено в течение 2 месяцев, несмотря на то, что рядом оставались квартиры, необработанные и сильно пораженные клопами.

Всего подвергнуто обработке 45 жилых объектов оперативной площадью около 8000 м². Результат действия препарата во всех случаях был высокоэффективным — 100% гибель клопов через 24 часа. В зимнее время в нескольких многокомнатных квартирах дезинсекции были подвергнуты изолированные комнаты, которые после обработки наглухо закрывали.

Исходя из полученных данных, считаем, что применение 0,05% водных растворов ДДВФ для борьбы с постельными клопами весьма эффективно и необходимо более широкое его испытание в различные сезоны года.