

УДК 616.34—002.44—089.8:616.833.191—089.85

**Ваготомия в хирургии гастродуоденальных язв.** Клюев И. И., Сурин В. М., Пиксин И. Н., Беликов В. С. Казанский мед. ж., 1985, № 2, с. 113—115.

Проанализированы результаты различных видов ваготомии с дренирующими операциями у 106 больных с гастродуоденальными язвами. У большинства больных ваготомия приводила к резкому снижению продукции соляной кислоты и пептической активности желудочного сока, к увеличению ощелачивающей способности антравального отдела желудка, а также к нормализации белковообразовательной функции печени. Отдаленные исходы изучены у 72 пациентов. Отличные и хорошие результаты выявлены у 56 (77,8%) больных, удовлетворительные — у 12 (16,7%), плохие — у 4 (5,5%). Лучшими оказались показатели после стволовой ваготомии.

**Ключевые слова:** гастродуоденальные язвы, хирургическое лечение, ваготомия.

Библиография: 8 названий.

УДК 618.2/7.:616.94

**О причинах гнойно-септических заболеваний и их профилактике в акушерстве.** Мифтахова Ф. А., Игнатьева Д. П. Казанский мед. ж., 1985, № 1, с. 115—118.

Проанализированы 19 случаев акушерского сепсиса и перитонита с описанием предрасполагающих факторов и динамики развития заболевания. Даны рекомендации по лечению и профилактике.

**Ключевые слова:** акушерский сепсис, перитонит, септический шок.

УДК 616.895.4—08:616.8—009.836

**Депривация сна в лечении больных с депрессивными состояниями.** Вейн А. М., Айрапетов Р. Г. Казанский мед. ж., 1985, № 2, с. 118—121.

Клиническим и психологическим методами изучено действие депривации сна на состояние 74 больных с депрессией различной этиологии. Положительная динамика статуса, наблюдавшаяся у 63,5% больных, подтверждена психологическими данными. Наряду с ослаблением собственно аффективных нарушений, уменьшились и другие проявления депрессии, в частности участвую-

щие в формировании ларвированных ее форм. Агрепническая терапия применима как при классической, так и ларвированной депрессии. В ряде случаев этот метод способствует преодолению терапевтической резистентности депрессии.

**Ключевые слова:** депрессия, депривация сна.

Библиография: 18 названий.

УДК 618.39—08:061.66:616—055.2

**Специализированная медицинская помощь при невынашивании беременности в условиях женской консультации.** Плужники Т. А., Бурая А. Г. Казанский мед. ж., 1985, № 2, с. 142—144.

Проанализированы причины невынашивания у женщин с исходом беременности в срочные роды (172 чел.) и преждевременные (123) чел.). Даны качественная оценка лечебно-профилактической помощи беременным обеих групп в условиях женской консультации. Результаты показали, что организация специализированной помощи при невынашивании беременности способствует улучшению качества лечебно-профилактической помощи беременным с угрозой невынашивания и позволяет снизить частоту данной патологии.

**Ключевые слова:** беременность, угроза невынашивания, женская консультация, профилактика.

1 таблица.

УДК 616.89—053.2—081.214

**Организационные основы внебольничной психиатрической помощи детям и подросткам в городском психоневрологическом диспансере.** Блюхерова Н. А., Алатырева Н. Н., Карпухина В. И. Казанский мед. ж., 1985, № 1, с. 145—146.

Изложены организационные основы внебольничной и психиатрической помощи детям и подросткам, оказываемой врачами-педиатрами, детскими невропатологами и психиатрами. Интенсивная психофармакотерапия проводится как в условиях диспансера, так и в некоторых случаях на дому. Внебольничная терапия повышает эффективность лечебных мероприятий и предупреждает социальную и трудовую дезадаптацию.

**Ключевые слова:** дети, подростки, психические заболевания, организация лечения.

## СОДЕРЖАНИЕ

Ратнер А. Ю. Родовые повреждения нервной системы у детей и их место в клинической медицине . . . . .

81

Клиническая и теоретическая медицина

86

Вургафт М. Б. Этапы изучения первичной глаукомы . . . . .  
Ерошевский Т. И., Касавина Б. С., Святковская Т. Я. Биохимическое исследование тканей глаза и сыворотки крови у больных открытоугольной глаукомой

88