

ходящих от сифилитических родителей, особенно от матерей-сифилитичек, так как даже при довольно строгом ограничении круга бессимптомных детей, оставленных без лечения, наблюдаются все же случаи появления положительной RW. 4) Наиболее желательным при врожденном сифилисе в раннем детстве, особенно для проведения первого курса лечения, является стационарное лечение в венотделениях больниц или в специальных детских учреждениях, куда грудные дети принимаются вместе с матерями. 5) Смешанное ртутно-сальварсанное лечение дает лучшие результаты в сравнении с чисто-ртутным в отношении частоты рецидивов, влияния на RW и на общее развитие ребенка. 6) Дети сравнительно хорошо переносят сравнительно большие дозы неосальварсана—до 0,02 на кило веса. *Р.*

43. *Сифилис желудка*—весьма редкое явление. Диагностика его трудна. С некоторой уверенностью можно говорить о сифилисе желудка при положительном результате антисифилитической терапии; с большей уверенностью это можно утверждать при обнаружении спирохет в иссеченном участке желудка; иногда, однако, и рентгеновское исследование дает характерную картину. Неггманн (British journal of radiology, XXXII, p. 325) описывает картину приподнятого, уменьшенных размеров желудка, который очень быстро наполнялся и опорожнялся. У pylorus'a определялся дефект наполнения, перистальтика была неравномерная. Картина в общем напоминала рак. Исследование крови и желудочного сока дало положительную RW. Проведенная антилюетическая терапия дала блестящий эффект—исчезновение дефекта и др. симптомов, на основании чего автор считает свой случай доказанным случаем сифилиса желудка. *Р. Я. Гасуль.*

44. *Сифилис мочевого пузыря*, по Ries'y (Mon. f. Harnkr., 1928, H. 12), представляет собою относительно-редкое явление. В большинстве случаев здесь имеют место проявления третичного lues'a, в форме похожих на папилломы гумм, переходящих потом в язвы. Цистоскопически гуммы эти зачастую бывает нельзя отличить от папиллом, и только анамнез больных и основательное исследование других органов дают точки опоры для правильного диагноза. Гораздо реже наблюдаются в пузыре вторичные сифилитические проявления в виде острого или хронического цистита с пиурией и поллактурией. Во всех этих случаях лучшим средством для борьбы с болезнью является энергичное общее антилюетическое лечение. *Р.*

м) Гонорея.

45. *Лечение хронической гонорреи матки и маточных придатков вакциной из живых гонококков.* Loeser (Med. Kl., 1928, № 25) получил очень хорошие результаты при хронической гоноррее матки и ее придатков от подкожного введения живых гонококков. Напротив, в острых и подострых случаях,—за исключением лишь случаев острого гонорройного артрита,—это лечение оказывается недействительным. Технически метод проводится след. образом: гной совершенно свежей гонорреи засеивается на Косч'овский кровяной агар; после 1-го, максимум 2-х пассажей гонококки культивируются в пробирках с асцит-агаром, на косых поверхностях которого делается змееобразный штрих; выросшие здесь гонококки смываются 3-мя куб. с. стерильного физиологического раствора, и 1—2 куб. с. этой взвеси при помощи обычного шприца вырываются больной под кожу левого плеча. Обычно при этом вводится под кожу 2—4 миллиарда зародышей. После впрыскивания наблюдается чрезвычайно резкая местная реакция,—получается нечто вроде ограниченной флегмоны; °, однако, лишь редко поднимается выше 38°; боли, неособенно сильные, проходят через 24—48 ч. Если первая инъекция не дает эффекта, что бывает в весьма редких случаях, то через 14 дней впрыскивание можно повторить. *Р.*

46. *Локализация гонорройного артрита.* Мауг и Времер (Münch. m. W., 1928, № 24) нашел, что общепринятое мнение, будто при гоноррее поражается только один сустав, неправильно. Из 5778 гонорройных больных 2,2% дали заболевание суставов, причем у 45% оно было в форме чистого моноартрита, у 28%—полиартрита и у 27%—полиартрита, перешедшего в моноартрит. Переход моноартрита в полиартрит не встречался. Чаще всего поражался коленный сустав, затем в убывающем порядке шли ручные и кожные суставы, плечевой, локтевой и остальные мелкие. В молодом возрасте чаще наблюдался моноартрит, в пожилом—полиартрит. Из других инфекций сифилис на 4800 случаев дал поражение суставов в 1,1%, в том числе в 20% в виде чистого моноартрита и в 80%—полиартрита; в сред-