

вопоказаны, напр., при бронхитах, бронхопнеймониях и т. п. При этих вливаниях толстой иглой дважды в день вводится по 20 к. с. цитрированной крови в полость брюшины в течение 5 дней. Результаты при всех вливаниях оказались у авторов блестящими.

Е. Кливанская-Кроль.

73. *Дефекты зубной эмали, как указание на заболевания в раннем возрасте.* Этиология дефектов в образовании эмали постоянных зубов долгое время оставалась неясной. Большинство авторов относило их к рахиту, тетании и сифилису. Kassowitz (Zeit. f. Kinderheilk., Bd. 38, H. 3) на основании своих исследований на большом материале (2753 случая) приходит к заключению, что основной причиной этих дефектов является общее расстройство роста организма в период развития зубов. Огромную роль играют при этом острые инфекционные болезни и, главным образом, корь, коклюш и пневмония; рахит же, тетания, сифилис и туберкулез в сравнении с острыми инфекциями играют второстепенную роль. Дефекты эти, по мнению автора, не являются, однако, результатом какого-либо специфического влияния определенной инфекции, а указывают только на то, что у данного лица в определенном возрасте имелось общее трофическое расстройство.

М. Лукьянчикова.

ж) Эвтропатология.

74. *Спальная сухотка и перитонит.* Preuss и Jacoby (Münch. med. W., 1924, № 37) описывают случай перфорации в свободную брюшную полость кишечной язвы у табетика, где диагноз прободения при жизни не мог быть поставлен, так как совершенно отсутствовали даже самые незначительные суб'ективные и объективные признаки как острой перфорации, так и последующего гнойного воспаления брюшины.

Я. Дайховский.

75. *Менингит и симпатическая нервная система.* Wöwling (Münch. m. Woch., 1924, № 20) сообщает о 83 случаях менингита, прошедших через Эрлангенскую клинику за 35 лет (1888—1923). Только в 1923 г. была настоящая эпидемия, явившаяся следствием мировой войны. До введения в терапию люмбальной пункции и менингококковой сыворотки смертность достигала 67%, с введением же этих мероприятий она пала до 38%; полное излечение имело место в 46%. Эпидемический менингит, по наблюдениям автора, протекает более злокачественно, чем спорадический. Важную роль играет здесь также возраст. Картина болезни в целом ряде случаев зависит от нарушения вегетативной нервной системы, особенно трофических центров; об этом свидетельствуют похудание, несмотря на усиленное питание, diabetes insidipus, лихорадка, пототделение, вазомоторные расстройства, рвота, herpes, замедленность дыхания, запоры у больных.

М. Вайнберг.

76. *К лечению эпидемического менингита.* На основании экспериментально-бактериологических исследований и клинических наблюдений доказано бактерицидное действие оптохина, впервые примененного при лечении эпидемического менингита Friedemann'ом: вещество это уже в растворе 1:10,000 понижает in vitro жизнедеятель-