

гда ограничиваться 1—2 смазываниями. Несмотря на это, результаты мы считаем благоприятными. Выписалось со здоровыми сосками 186 женщин (62%), с значительным улучшением 87 (29%), с небольшим улучшением 3, без изменения или неопределенные результаты 23 (7%) и 1 отказ от смазывания вследствие болезненности.

Исход 18 случаев 3-й степени, наиболее трудно поддающихся лечению, был следующий: выздоровлений 9, заметных улучшений 6, небольших улучшений 1 и без изменения 2. Из этих 18 случаев смешанным способом, т. е. 5% Sol. kali hypermang. и 3% methylenblau, лечилось 3 с результатами: 2 выздоровления и 1 небольшое улучшение.

## Операция закрытия калового свища способом эвагинации кишки.

Д-ра В. М. Осиповского. (Костенеево, ТССР).

Б-ная Чер—ва Мария, 57 лет, русская, крестьянка с. Свиногорье Елабужского района поступила 20/X 30 г. в хирургическое отделение Костенеевской б-цы по поводу стойкого незаживающего калового свища в левой паховой области. Свищ получился год тому назад после ущемления паховой грыжи (последующего нагноения и прорыва наружу). Из свища выделяется жидкий кал, кожа вокруг свища сильно раздражена и частично мацерирована. Отверстие свища с медную трехкопеечную монету. Б-ная подвергалась в 1929 и 30 г. операциям закрытия калового свища (освежение краев с последующим запшиванием, выжигание термокаутером, пластика и т. д.) и консервативному лечению,—но все это не дало заживления, Б-ная среднего роста, худая, истощена, с бледными покровами. Сердце и легкие нормальны.

27/X 30 г. под спинномозговой анестезией была произведена операция. Наружная поверхность свища за несколько дней до операции готовилась мазевыми повязками и за день до операции очищена и продезинфицирована. Подготовка операционного поля спиртом и t-ae iodi, свищ закрыт стерильными салфетками.

Разрез, выше свища на три поперечных пальца, левый парапектальный, длиною в 10 сант. Рана разведена расширителями, к париэтальной брюшине, соответственно месту свища, припаяна петля тонкой кишки длиною в 12 сант. и замурована спайками с сальником. Осторожно, тупым путем, спайки нарушены и кишечная петля несколько отсепарована от прикрепления к париэтальной брюшине. Кишечник отгорожен салфетками. На расстоянии 2 сант. с обоих сторон на вращенную в свищ кишку наложены по два жома Doyen'a и между ними кишечка пересечена. Кишечные отрезки соединены end to end и защищены муфтой из сальника. Свищевые отрезки кишки с обеих сторон были наглоо зашиты и бранши сняты. Корнцангом со стороны брюшной полости отрезки были вывернуты наружу в свищевое отверстие. С внутренней стороны на образовавшуюся „воронку“ от вывертывания кишечного отрезка наложены три шва и подведен кусочек сальника. Рана запита наглоо. Коллодийная повязка. После этого в области свища иссечены с частью здоровой ткани вывернутые отрезки кишки. Два шва на кожу и тампон в нижний угол послесвищевой раны.

Послеоперационное течение гладкое, тампон удален на третий день, отделяемого нет. Отверстие после тампона загранулировалось и свищ окончательно закрылся. Б-ная выписана на 14 день после операции совершенно оправившаяся и с закрывшимся свищем. Я видел больную почти через год после операции, чувствует себя очень хорошо, пополнила; на месте свища теперь рубец.

Операция закрытия каловых свищ способом эвагинации резецированных отрезков кишки через свищевое отверстие технически проста и целесообразна. Она имеет преимущества перед остальными способами тем, что позволяет провести вполне асептично вне раздраженной ткани операцию и удалить „свищевое содержимое“ целиком внебрюшинно. Последнее обстоятельство особенно ценно, т. к. существенным моментом в операции закрытых каловых свищ надо считать опасность инфицирования брюшины кишечным содержимым.

В русской литературе, насколько нам известно, таких операций описано очень мало. Так, д-р И. И. Садовский (Каз. мед. журн., № 10, 1929 г.) собрал с двумя своими—9 случаев, М. В. Карташев (Каз. мед. журн., № 3, 1930 г.) описал еще 1 случай (десятый) и к этим уже описанным случаям мы прибавляем и наш.