

правильный диагноз, все равно 6-му нельзя было бы помочь. Вообще Пильч предостерегает от оптимизма американских нейрохирургов и присоединяется к Бартенбергу, предлагающему побольше сообщать случаи с неблагоприятными исходами.

Ив. Галант (Ленинград).

53) О психозах при малярии сообщают Скляр и Рябова (Астрахань) в Monatsschrift f. Psychiatrie Bd. 78. I (1931): 75 случаев, из них 49 мужчин и 26 женщин. Среди этих 75 случаев 20—обычные психозы (7 Dementia praecox, 7 паралитиков, 6 циркулярных) и 7 случаев истерии, остальные 48 случаев представляют собой настоящие острые инфекционные психозы и обнаружались в форме следующих экзогенных типов реакции. 10 делириев (4 кончились летально), 7 маниакально-депрессивных делириев, 19 сумеречных состояний, 3 корсаковских и парализоподобных состояний, 2 психоза страха, 2 галлюциноза, 2 аментивных состояния, 1 синкопальное состояние, 1 фантастический инфекционный бред, 1 постинфекционное затяжное состояние слабости. Этиологическое значение малярии при малярийных психозах заключается не в одной только высокой температуре, т. е. психоз начинается правда иногда на высоте температуры, в других же случаях при низкой температуре еще бывают случаи когда малярийная инфекция вызывает то психические, то фебрильные приступы (эквиваленты). Формы психозов, развивающихся после малярии, зависят в значительной мере от степени истощения. Предрасположение к транзиторным психозам у наследственно отягощенных, психопатических личностей играют известную роль при развитии малярийных психозов.

Специфических малярийных психозов нет, все же эти психозы имеют свою особенную окраску и различия количественного порядка. В сравнении с другими инфекциями преобладают при малярийных психозах сумеречные состояния, делирии же и аментивные состояния отступают на второй план. В прямой зависимости от специфической малярийной инфекции находятся т. наз. эквиваленты, т. е. психозы, развивающиеся во время афебрильного приступа малярии, т. е. они в то же время „замещают“ температуру. Характерны для эквивалентных малярийных психозов, начинающихся обычно различными нервно-соматическими явлениями, как ползание мурашек, звон в ушах, озноб или жар, обильное пототечение, страх, психомоторное возбуждение.

Отметим еще, что по наблюдениям Скляра и Рябовой в 7 их случаях, где малярия комбинировалась прогрессивным параличем, малярия была агент provocateur прогрессивного паралича, первые явления которого обнаружались непосредственно после малярии.

Ив. Галант (Ленинград).

54) F. Illing (Möschl Psychiatr. 78. 1931 г.) описывает 3 случая психоза при злокачественном малокровии. 1 случай носил характер периодических психических расстройств симптоматической окраски, другой случай отличался делириантно-аментивным своим характером и развивался вероятно в связи с миокардэмболией. Все 3 случая, в основе которых лежала депрессивная картина состояния, расцениваются автором как случайно при anaemia perniciosa развившиеся меланхолии.

Ив. Галант (Ленинград).

55) Albrecht Peiper (D. med. Woch., № 18, 1932) допускает наличие специального центра зевания, который филогенетически образует более глубокую составную часть центра дыхания, и обычно тормозится этим последним. Когда же, однако, при переутомлении торможение со стороны высшей части центра дыхания прекращается или хотя бы ослабевает, то центр зевания расстреливается и временно „берет в свои руки управление дыханием“. Зевает не для того и не потому, что одолевают этим переутомление, а вследствие утомления.

Ив. Галант (Ленинград).

56) Robert Galatzer („Wiener Klin. W.“ № 17, 1932) восхищается своим успехом „соматического лечения“ психоза по предложенному Венским гинекологом Бернгардом Ашнером методу лечения психозов кровопусканием, слабительными и рвотными средствами. В одном случае острого психоза (спутанное состояние с беспокойством, бессонница, бред преследования) а. произвел кровопускание (300 см.), дал 6-му „слабительный чай“ (Fol. sennae, Rad. Iquir. R. Rhei, Fruct. Foenic. aa) и рвотное (Decoct. rad. Cyclam. c. Ozymel Scillaе, Sir. Rub. Id. aa) и 6-ой выздоровел.

Ив. Галант (Ленинград).