

ки (febris undulans) и передачу ее поср. козьего молока, а также открывший трипанозому сонной болезни и роль мухи це-це в ее передаче.

100) В Вене 30/X умер один из основоположников медицинской рентгенологии проф. Guido Holz kneht (род. в 1872 г.). Еще в 1903 г. им была выпущена книга: Lehrbuch d. Rontgenuntersuchung d. Brusteingeweide, в 1902 г. им был изобретен первый хронорадиометр. Умер Holz kneht от рентгенового рака, после того как ему была ампутирована левая рука.

101) Умер выдающийся шотландский невролог проф. W. El d e r (67 л.), много занимавшийся афазией, аграфией и исследованием памяти.

102) Умер выдающийся американский акушер проф. W. Williams (род. в 1866 г.) Его учебник был самым распространенным в Америке. Он был одним из первых, заговоривших о важности гигиены матери и ребенка. Из его работ наиболее известны работы об эклампсии и дуэрперальных инфекциях.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.

8) Мог ли возникнуть рак губы у 38 летнего субъекта вследствие частых тресканий губы и скусывания и сдирания слизистой губы зубами и 9) может ли рак развиться без раздражения.

Под. Туполев.

Ответ. Все наши современные знания о раке, почерпнутые из клинических наблюдений и лабораторного эксперимента, единогласно свидетельствуют в пользу многообразия причин, создающих опухоли, и отсутствия какой-либо единой специфической причины. Разнообразные раздражители при достаточно долгом действии могут вызывать злокачественные опухоли. С другой стороны, и в отсутствии уловимых внешних раздражителей могут возникать раки (желудка, молочной железы и др.). Рекомендуется просмотреть книгу проф. Н. Н. Петрова. Учение об опухолях и Труды I Онкологического съезда.

Прив. доц. И. Ци.м.хес.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.

В № 9—10 „Каз. мед. журн.“ появилась ст. Л. Н. Андреева о применении зажима Кохера при обработке пуповинного остатка у новорожденных. Автор, повидимому, не ознакомился с историей этого вопроса и с относящейся сюда литературой. Применение зажима на пуповину предложено мною (см. мою статью „О методах отделения новорожденного от последа“ в Журн. акуш. и женск. бол. за 1905 год). С той поры я неизменно пользуюсь этим методом, причем зажим через 2 часа после рождения ребенка удаляется. За время моего 18-летнего заведования акушерской клиникой в Саратове этот метод с успехом использован более чем в 3000 случаях.

Проф. Н. Какушкин.

Саратов, Мал. Кострижная 5.