

ЭНДОМЕТРИОЗ ПУПКА¹

Асс. М. А. Давыдова

Из кафедры акушерства и гинекологии (зав.—проф. Н. Е. Сидоров)
Казанского ГИДУВа им. В. И. Ленина

Эндометриозом называется разрастание ткани, похожей на слизистую оболочку матки.

Эндометриоз пупка встречается и описывается очень редко; поэтому считаем возможным представить наше наблюдение.

Б-ная К., 43 лет, поступила в клинику 28/XI-56 г. по поводу кровянистых выделений из пупка во время менструаций. Больной себя считает около года.

Менструация с 17 лет, беременность была 6 раз. Роды нормальные 4 раза, 4-я и 6-я беременности окончились искусственными абортами, последний аборт 5 лет тому назад. Менструальная функция нормальная, последние крови 17/XI-56 г.




Рис. 1

Телосложение правильное, рост выше среднего, кожа и видимые слизистые нормальной окраски. Со стороны внутренних органов патологических изменений нет. Живот мягкий, безболезненный, обильное отложение подкожной жировой клетчатки на брюшной стенке. Пупок размером 2×2 см, пигментирован — цвета темного загара, выступает над поверхностью брюшной стенки, плотный, мелкобугристый из-за полипозных разрастаний (рис. 1). При надавливании выделений нет. Влагалище рожавшей, шейка матки цилиндрическая, наружный зев закрыт. Матка в правильном положении, несколько увеличена, плотная, подвижная, безболезненная. Придатки не увеличены. Шейка чистая. Выделения белые.

30/XI-56 г. произведены пробное выскабливание полости матки и биопсия из пупка. Слизистая тела матки в стадии пролиферации. В кусочке из пупка среди фиброзной ткани островки слизистой тела матки в стадии пролиферации. Диагноз: эндо-

метриоз пупка. 15/XII-56 г. выписана.

3/I-58 г. поступила вновь. После биопсии выделения из пупка усилились и стали кровянистыми. Появляются они за день перед менструацией и прекращаются с ее окончанием. Менструальная функция нормальная, последние крови 24/XII-57 г. Обильно — то же самое, что и при первом поступлении.

6/I-58 г. под местной анестезией пупок иссечен.

Заживление первичным натяжением. В настоящее время здорова, менструальная функция нормальная.

Поступила 22 июля 1959 г.

НЕВРАЛГИЯ ЯЗЫКОГЛОТОЧНОГО НЕРВА И ЕЕ УСТРАНЕНИЕ ПУТЕМ СТЕВЛОВОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ

Проф. С. Н. Вайсблат
(Киев)

Невралгия языкоглоточного нерва описывается, в отличие от невралгии тройничного нерва, редко.

А. Н. Филатов, собравший в 1930 г. в литературе описание 26 случаев невралгии языкоглоточного нерва, правильно указывает, что небольшое количество опубликован-

¹ Доложено в обществах патологов — 11/I-58 г. и акушеров-гинекологов — 5/II-58 г.