

С края шанкерной язвы соскабливается небольшое количество сока на чистое предметное стеклышко, мазок высушивается на воздухе, и на него накапывается 3% водный раствор *Viktorriablau Grübler's*. Раствор оставляется на 2—3 минуты, потом смывается водопроводной водой, препарат обсушивается и рассматривается под иммерзией, причем бледные спирохеты оказываются окрашенным в густо-синий цвет, резко отличающимся от других спирохет. Будучи сохраняем в склянке из темного стекла, раствор краски может сохраняться долгое время без изменения. P.

396. *Инфекция сифилисом со стороны отца.* Almqvist (The urol. and cutan. review, 1927, № 11) сообщает 5 случаев наследственного сифилиса у детей, где матери, несмотря на годами длившееся наблюдение, оказывались клинически и серологически свободными от *lues'a*, отцы же были сифилитиками. Автор думает, что плод или яйцо может быть инфицировано контагиозной спермой, причем мать остается свободною от инфекции. B. C.

м) *Болезни уха, носа и горла.*

397. *Абсцесс мозга при остром отите.* P. Sauer (Zeit. f. Hals, Nasen u. Ohrenheil., 1927, 17 Bd., Hf. 2) дает описание остро развившегося на почве otitis acuta абсцесса в височной доле мозга. Больная с самого начала заболевания уха находилась под наблюдением, и таким образом у ней представлялась возможность проследить весь болезненный процесс с начала до конца. Заслуживает внимания в данном случае отсутствие изменений в кости, каковые изменения почти всегда констатируются в среднем ухе и *proc. mastoideus* в тех случаях, где наступает образование мозгового абсцесса. Ник. Трутнев.

398. *Саркомы носа.* Христианов (Вестник Р.Ю., 1927, № 6) собрал статистический материал, касающийся злокачественных опухолей носа. Из последнего видно, что на долю сарком приходится очень немного случаев, причем гигантоклеточковая саркома встречается, как *unicum*. Она имеет чрезвычайно быстрый рост, постоянно рецидивирует, но ни болей, ни кахексии не вызывает. Автор приводит два собственных случая этого новообразования. Громов.

399. *Случай риносклеромы с редкой локализацией.* Д-р Гуменюк (Журн. ушн., нос. и горл. бол., 1927, № 7—8) описал случай риносклеромы с редкой локализацией: помимо носа, носоглотки и зева, процессом одновременно были захвачены верхняя губа и верхняя десна. Н. Бобровский.

400. *Инородное тело в пищеводе.* Д-р Рожкова (Вестник Р.Ю., 1927, № 6) описывает случай инородного тела в пищеводе, именно, зубного протеза. Особенностью этого случая является то обстоятельство, что при отыскивании протеза встретились с некоторыми затруднениями, а извлечь его удалось лишь при третьем по счету введении трубки эзофагоскопа. О. Васильева.

Рецензии.

Проф. K. Schleyer. *Болезни почек.* Госиздат, 1928, ц. 75 к., и издательство «Практич. Медиц.», 1927, цена не указана.

Книжка написана большим знатоком почечной патологии. Будучи сам одним из основателей современного учения о функциональной диагностике почек,—припомним его исключительной ценности исследования о функции почек при экспериментальных нефритах,—проф. S., естественно, в своей книге главное внимание обращает на значение для врача изучения функции заболевшего органа, не затрагивая патолого-анатомической стороны вопроса и преднамеренно не останавливаясь на спорных теоретических проблемах. Цель книжки—чисто-практическая, дать ясное и краткое изложение современного состояния учения о почечных заболеваниях и точно, конкретно формулировать необходимые и притом только надежные терапевтические мероприятия. Автор, несомненно, достиг своей цели, и мы смело можем рекомендовать его книгу для прочтения каждому врачу, интересующемуся вопросами почечной патологии. Книжка, как это указано в заголовке, выпущена почти одновременно двумя издательствами, что, по нашему мнению, в значительной мере расходится с принципом «режима экономии».

Проф. М. Чебоксаров.