

в день. После операции дача digitalis внутривенно 2 раза в день продолжалась— после больших операций в течение 8 дней. За последнее время В ѿ г i, S t r a u s s и др. предлагают одновременно вводить в различных комбинациях: наперстянку, кофеин, стрихнин, сцилларен и строфантин. Автор применял из препаратов наперстянки дигитокрин, от которого видел верное и интенсивное действие.

II. Цимхес.

3) Акушерство и гинекология.

584. *О переношенных плодах.* По S e l l h e i m 'у (Münch. m. W., 1928, № 22) среди случаев чрезмерной продолжительности беременности следует различать 2 категории: в одном ряде этих случаев беременность оканчивается рождением чересчур большого плода, в другом—плод погибает еще в утробе матери вследствие расстройств питания. Как и всякая другая ткань, ткань плаценты имеет определенную продолжительность жизни, определяемую 280 днями. По истечении этого срока в ней начинаются регressive процессы, сказывающиеся на состоянии плода,—утолщение сосудистых стенок, выполнение межворсинчатых пространств фибрином, атрофия хориального эпителия и пр. Судить о начале этих процессов можно по биологическим реакциям в крови беременной, свидетельствующим о понижении функций плаценты. Раз это установлено, то для спасения плода необходимо искусственно прервать беременность, прибегая к разрыву плодного пузыря, назначению хинина и пр. P.

585. *Усиление функции грудных желез облучением их горным солнцем.* Как известно, повышение отделения молока в грудях было до сих пор одной из труднейших задач терапии. По V o g t 'у (Deut. med. Woch., 1928, № 33) эта задача решается очень просто: освещение грудей лучами искусственного горного солнца представляет собою простое, действительное и безвредное средство благоприятно влиять как на первичную, так и на вторичную гипофункцию грудей,— средство, позволяющее проводить в течение долгого времени естественное вскармливание грудных детей без перевода их на искусственное питание. P.

586. *Инсулин при токсикозах беременности.* L o e s e r (Zentr. f. Gyn., 1928, № 22), применив инсулин в комбинации с глюкозой в 45 случаях токсикозов (ацидозов) беременности, получил от такого лечения весьма благоприятные результаты: рвота беременных, дерматозы, эклампсия частично вполне излечивались, частично давали поразительное улучшение. При этом в отчаянных случаях hyperemesis gravidarum автор давал ежедневно, в 2 приема, от 10 до 40 единиц инсулина подкожно, предварительно вводя на каждую единицу инсулина 2—4 грамма глюкозы per rectum или внутривенно. При эклампсии инсулина давалось от 20 до 40 единиц, глюкозы же—от 1 до 2 грамма на каждую единицу, per os или внутривенно. P.

587. *Адреналин, как средство для расслабления контракционного кольца во время родов,* рекомендует R u c k e r (по Berich. ѹ. d. ges. Gyn., Bd. 13). Образование контракционного кольца является таким осложнением, при котором выживание было бы ошибочно. Наркотики здесь не помогают. Иногда помогает амилнитрит, иногда горячие ванны. Форсированное извлечение плода щипцами или попытки к повороту могут кончиться катастрофически. N i e k s делает декапитацию, затем поворот (!), L o c h r a n e советует декапитировать или краинотомировать, а затем произвести sectio caesarea. Более оптимально смотрит на дело Нагрег, который производит роды per vias naturales, после того, как судорога прекращена глубоким эфирным наркозом. Автор предложил адреналин, т. к. считает, что образование контракционного кольца есть следствие повышенной раздражимости парасимпатической нервной системы. Из 10 случаев применения адреналина в 9 у него получился полный эффект. A. Тилюбееев.

588. *Грязелечение и электроионотерапия при хронических воспалительных заболеваниях женской половой сферы.* Д. Е. Ш м у н д а к и Г. Л. К а п е в с к и й (Вр. дело, 1928, № 17) проводили чистое грязелечение, а также грязелечение в комбинации с электроионотерапией подистым калием. При первом они имели выздоровление в 19%, значительное улучшение—в 5% и незначительное улучшение—в 36%, при втором 0% выздоровлений повысился у них до 36, значительных улучшений—до 45 и лишь в 15% они получили незначительное улучше-