

3) Последовательное лечение предпринимается для закрытия костного дефекта. Здесь схема такова: а) дефект меньше 2-франковой монеты не нуждается ни в оперативном лечении, ни в протезировании; б) в височной и затылочной областях даже дефекты в 5-франковую монету также не нуждаются в лечении; в) такой же дефект в лобной и теменной областях требует краниопластики; г) если дело идет о больших дефектах черепа (в ладонь), предпочтительны различные протезы.

М. Знаменский.

425. *Пептическая язва тощей кишки после иссечения желудка.* G. Nyström и F. Soderberg (Zbl. f. Chir., 1928, № 5) наблюдали у 47-летнего больного, после иссечения привратника и половины желудка из-за язвы 12-перстной кишки, образование такой же язвы в тощей кишке. После второй операции, иссечения почти всего желудка, наступило полное выздоровление. *С. С—в.*

ж) Акушерство и гинекология.

426. *Рукавная флора в климактерии.* Kessler и Lehmann (Arch. f. Gyn., Bd. 133) нашли, что прекращение деятельности яичников тотчас же ведет за собою уменьшение содержания гликогена в рукавной мукозе и ухудшение флоры рукава. На этой почве легко развивается старческий кольпит. *Р.*

427. *Прозодимость плаценты для трипанозом и спирохэт.* На основании своих опытов Philipr (Arch. f. Gyn., Bd. 133) убедился, что плацента для трипанозом является непроходимой, для спирохэт же она проходима как у животных, так и у человека, причем спирохэты проникают через плаценту даже и в тех случаях, когда она не представляет, повидимому, никаких гистологических изменений. *Р.*

428. *Одонтогенная инфекция у родильниц.* Sachs (Zentr. f. Gyn., 1928, № 16), приведя один случай пuerперального сепсиса одонтогенного происхождения, настоятельно советует, в интересах профилактики родильной горячки, лечить у беременных болезни зубов, особенно гнойные процессы. Он настаивает также на том, чтобы врачи возможно энергично боролись против распространенного в публике убеждения, что во время беременности лечить зубы не следует. *Р.*

429. *Гистероскопия (метроскопия).* Gauss (Arch. f. Gyn., Bd. 133, H. 1) с большою похвалою отзываясь об этом методе исследования, при помощи которого можно распознавать наличие в матке остатков плодного яйца, маточные полипы и рак тела матки, диагностировать причину маточных кровотечений и ход обратного развития пuerперальной матки. Возможно, затем, что при помощи этого способа гинекологи в состоянии будут осматривать маточные устья труб, зондировать и катетеризировать каналы последних. Противопоказанною является гистероскопия при беременности, инфекционных заболеваниях полового канала и заболеваниях придатков. Выполнение ее требует строгого соблюдения правил асептики. *В. Сергеев.*

430. *К терапии гонорреи матки.* Zieler (Deut. med. Woch., 1928, № 1) приходит по этому вопросу к след. положениям: 1) Местное лечение триппера цервикального канала, гесп. матки, после того, как первые острые явления миновали, является наиболее целесообразным способом добиться излечения болезни с избеганием осложнений. 2) Необходимым условием для этого является покой внутренних органов, достигаемый назначением атропина или папаверина. 3) Из разных способов раздражающей терапии известное значение, в качестве вспомогательного метода, имеет лишь применение гонококковой вакцины. 4) Во время menses, а также тотчас перед и после них, всякое лечение надо прерывать, в том числе и применение средств, действующих на общее состояние, если они вызывают лихорадку. *В. С—в.*

431. *К образованию искусственного влагалища.* Как известно, для этой цели гинекологи пользуются преимущественно двумя методами,—методом Waldwin'a-Mori, при котором искусственное влагалище образуется из тонкой кишки, и методом Попова-Schubert'a, где для образования искусственного рукава пользуются прямой кишкой. Каждый из этих методов имеет своих защитников и противников, ибо каждому из них присущи свои выгоды и свои недостатки. Желая соединить преимущество обоих методов, E. Ruge (Mon. f. Geb. u. Gyn., 1928, Bd. 78) предлагает образовать искусственное влагалище из flexura sigmoidea, каковой способ был с успехом испробован им в 5 случаях. *Р.*