

уступила это место сначала Дании, потом Голландии, а теперь рекорд в этом отношении стремится побить Германия.

69) В 1911 г. в Англии было зарегистрировано 276 смертных случаев от паркоза, а в 1926—уже 556. (Вр. Г., 1928, № 3).

70) В истоктом 1927 г. Упсальский Университете (в Швеции) торжественно отпраздновал 450-летие своего существования.

71) В № 1—2 «Сарат. Вест. Здравоохр.» за тек. г. напечатаны впечатления проф. Н. Е. Осюкина о посещениях им клиник в Йопе и Галле. Статья наводит на очень печальные размышления нас, работающих в отечественных университетах: она свидетельствует, какого «огромного размера дистанция» отделяет хотя бы Казанский Университет даже от второстепенных германских университетов в смысле оборудования.

72) По данным Лиершаппа число абортон в Германия, несмотря на запретительные меры, быстро растет: в 1911 г. их было 240 тыс., в 1923—500 тыс., а в 1924—815.750 на 1,313,625 срочных родов). (Проф. М., 1928, № 2).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.

6) Встречаются ли в литературе случаи эхинококка легкого с прободением диафрагмы в брюшную полость?
Подписчик № 1194.

Ответ: Эхинококки легкого редко прорываются в брюшную полость. Из литературных источников по интересующему Вас вопросу можно указать: 1) Труды I Съезда Хирургов Северо-Кавказского края 23-26 сент. 1925 г.; 2) Острогорский И. Вестн. Хир. и Погр. Обл., т. XI, кн. 33; 3) Струникин В. Врач. Дело, № 11—13 и № 24—26 1924; 4) Сокол, Врач. Дело, № 24—26 1924 г.; 5) Абражнов В. Врач. Дело, №№ 9—10 и 11—12 1923 г. *И. Цимхес.*

7) Просьба сообщить литературу по вопросам об эхинококке суставов и дермоидных кистах селезенки.
Подписчик № 1153.

Ответ: 1) Эхинококки в области коленного сустава встречаются очень редко. Обычно эхинококки в таких случаях локализируются в подколенной ямке, в кости или окружающих тканях, причем иногда может прорваться в коленный сустав. Некоторые литературные данные по этому вопросу имеются в монографии проф. П. И. Тихова «Повреждения и заболевания коленного сустава», Рус. Хир., т. 6, 1915. См. также Орловский И. «Казуистике эхинококка с редкой локализацией», Хирургия, 1903.

2) Дермоидные кисты селезенки представляют исключительную редкость. Michelson (Die Ergebnisse der modernen Milzchirurgie, Erg. d. Chirurgie und Orthoped., Bd. VI) упоминает об отдельных наблюдаемых холестериновых и дермоидных кист селезенки (Litten, Virchow, Orth).

Проф. В. Л. Боголюбов.

ПОПРАВКА.

В ст. д-ра И. А. Цимхеса «К распознаванию и патологии поддиафрагмальных нагноившихся эхинококков», помещенной в № 2 «Журнала» на стр. 210 напечатано:

строка 9 снизу «...вследствие умирания паразита...»

» 4 » «...является нагноение вследствие умирания...»

должно быть:

«...вследствие инфекции и умирания паразита...»

«...является нагноение с умиранием...»

МЕДИ

Издание

Выходит при
Медицинском
Института д

От