

309. Сочетание сердечной астмы и грудной жабы. По F. Виппну (Wien. klin. W., 1927, № 41) такое сочетание в практике встречается сравнительно нередко, причем в этих случаях наряду с характерными болями имеются приступы одышки. Помогают в таких случаях, и очень быстро, вспрыскивания вытяжки мозгового придатка.

C. C-в.

310. Лечение хронического бронхита и зависящей от него астмы. Veilchenblaum (Münch. med. W., 1928, № 5) видел хорошие результаты при этой болезни от внутривенных вспрыскиваний 50% кодиолового раствора в возрастающих и потом уменьшающихся количествах (1—6 кб. сант.), с промежутками по 3 дня. Случай, осложненные бугорчаткою легких, отсюда исключаются.

C. C-в.

311. Инсулин и диабетическая кома. David (Ther. d. Gegenw., 1928, № 2) на основании обширного статистического материала подчеркивает необходимость возможно-раннего применения инсулина при диабетической коме: если лечение начато в первые 6 часов по наступлении потери сознания, то оправляются почти все леченые; напротив, после 12 часов надежда на сохранение жизни равна почти нулю (некоторые больные и здесь еще приходят в себя, но гибнут потом при явлениях наростающей сердечной слабости, вследствие общей неспособности клеток окислять сахар).

C. C-в.

312. Слизистый колит. По данным, имеющимся в Journ. of Amer. Med. Ass., 1927, № 4, причины слизистого колита бывают весьма различны: механические, химические, нервные. Септические фокусы в зубах, в миндалинах, в тазу играют здесь также нередко важную этиологическую роль. Если ни одна из этих причин не обнаружена, то в основе колита лежит или нарушение обмена, или расстройства со стороны нервной системы. В большинстве случаев слизистый колит есть тяжелая форма спастического запора, обусловленная стазом в проксимальной части толстой кишки и спазмом — в дистальной; первый вызывает раздражение фекальных массами и на этой почве — спазм поперечно-ободочной и нисходящей толстой кишки, а это в свою очередь усиливает стаз. Спазм может быть ослаблен масляными клизмами и приемами регос оливкового и кастронового масла, применением тепла на живот и назначением внутрь препаратов белладонны, а также легкой диетой; длительное применение последней впрочем ухудшает состояние, вызывая запоры. Гигиена духа наряду с указанными средствами также должна играть видную роль в лечении: нервные больные должны быть убеждены в легкости и безопасности для них данного заболевания. В случаях, где причиной слизистого колита является амебная дизентерия, хорошие результаты дает стоварсол по 0,25.

H. Крамов.

313. Лечение амебной дизентерии. Лечение этой болезни эметином, проведенное Manson-Wah'g'om (Brit. Med. J., 1927, № 3480) у 87 больных, дало вполне удовлетворительные результаты в ранних стадиях болезни, в хронических же случаях оказалось безуспешным, несмотря на высокие дозы эметина (до 80 гран и больше). Напротив, эметин-висмут-ид, проведенный на 40 случаях, только в 5 из них не дал постоянных результатов. Недостатки этого средства (привыкание к лекарству, побочные неприятные действия) побудили, однако, автора прибегнуть к комбинации его с иатреном, причем последний вводится в клизмах, эметин-висмут-ид же — регос, по 3 грана на ночь. Испробовав эту комбинацию в 22 случаях, где один эметин был безуспешен, автор нашел, что при помощи ее можно бороться с амебными поражениями прямой, слепой и восходящей кишек.

H. Крамов.

314. Свист поджелудочной железы. R. Trnka (Casopis lékařů českých, 1927, № 35) в одном случае трауматического свиста поджелудочной железы убедился, что организм может в течение 1/2 года переносить потерю поджелудочного сока без каких-либо объективных и субъективных расстройств. Принимавшаяся регос соляная кислота увеличивала у больного отделение сока, а щелочи — уменьшали, так что железа реагировала, как здоровая.

C. C-в.

б) Хирургия.

315. К лечению злокачественных опухолей. E. Lick (Zentr. f. Chir., 1928, № 5) оперировал 52-летнего мужчину по поводу рака полового члена; операция состояла в ампутации члена и вылущении паховых желез, причем ран в пахах зашить наглухо не удалось. Два месяца спустя наступило рожистое воспа-